

【耳-13-2】☆アービタックス+FP 療法(2回目以降)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	レスタミンコーワ5錠		アービタックス投与 30～60 分前に内服
薬剤 2	カイトリルハッグ 3mg+デカドロン(3.3mg)3A+ファモチジン 1A		30 分で点滴
薬剤 3	アービタックス	250mg/m ²	生食 250ml(アービタックス量 ml)に混注し 1 時間で点滴
薬剤 4	アプレピタントカプセル	125mg 内服	ランダ開始 1～1.5 時間前に内服
薬剤 5	ソルアセット F500ml+硫酸 Mg 補正液 8ml		1 時間で点滴(インフュージョンリアクション経過観察用)
薬剤 6	【側管】マンニトール	300ml	30 分で点滴
薬剤 7	【側管】ランダ	70mg/m ²	生食 500ml(ランダ量)に混注し 2 時間で点滴
薬剤 8	ソルデム3	500ml 4袋+5-FU 700mg/m ²	24 時間持続点滴

(Day2-4)

※Day2、3 は朝食後にアプレピタントカプセル 80mg を内服(午前中に内服できれば問題なし)

薬剤 1	ソルデム3	500ml 4袋+5-FU 700mg/m ²	24 時間持続点滴
------	-------	------------------------------------	-----------

(Day8, 15)

薬剤 1	レスタミンコーワ5錠		アービタックス投与 30～60 分前に内服
薬剤 2	生食	100ml+デカドロン(3.3mg)1A	30 分で点滴
薬剤 3	アービタックス	250mg/m ²	生食 250ml(アービタックス量 ml)に混注し 1 時間で点滴
薬剤 4	生食	100ml	1 時間で点滴(インフュージョンリアクション経過観察用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
アービタックス	↓	↓	↓	休薬完了
ランダ	↓			休薬完了
5-FU	↓			休薬完了