

【耳-15-1】Mアービタックス+PTX+CBDCA療法(初回)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)※ 点滴開始前にレスタミンコーワ5錠を内服			
薬剤1	アロキシ点滴用バッグ 0.75mg+デカドロン(3.3mg)4A+ファモチジン 1A		
			30分で点滴
薬剤2	アービタックス	400mg/m ²	生食 500ml(←アービタックス量 ml)に混注し2時間で点滴
薬剤3	生食	100ml	1時間で点滴(インフュージョンリアクション経過観察用)
薬剤4	パクリタキセル	200mg/m ²	生食 500ml に混注し3時間で点滴
薬剤5	パラプラチン	200mg/m ²	生食 250ml に混注し1時間で点滴
薬剤6	生食	100ml	全開(ルートフラッシュ用)

(Day8, 15)※ 点滴開始前にレスタミンコーワ5錠を内服

薬剤1	生食 100ml+デカドロン(3.3mg)1A	30分で点滴
薬剤2	アービタックス 250mg/m ²	生食 250ml(←アービタックス量 ml)に混注し1時間で点滴
薬剤3	生食 100ml	1時間で点滴(インフュージョンリアクション経過観察用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
アービタックス	↓	↓	↓	休薬完了
パクリタキセル	↓			休薬完了
パラプラチン	↓			休薬完了