



糖尿病タイムズ



第55号（2025年 5月 日発行）



世界初！週1回投与の持効型溶解インスリン製剤 「アウィクリ®注フレックスタッチ」



従来1日1～2回の注射が必要であった基礎インスリンの補充が、アウィクリ®注の登場により週1回の投与で効果が期待できる画期的な注射薬です。

アウィクリ®注の作用

ゆっくりと長期間にわたって作用するため、週1回の投与で持続した効果が期待されます。



注射のタイミング

毎週同じ曜日に皮下注射してください。

(※注射する時間は、ずれていてもかまいません)

注射を忘れた場合の対処法

注射を忘れた場合は、気づいた時点で直ちに注射してください。その次の注射は4日間以上の間隔をあけてから行い、その後は新たな開始日と同じ曜日に注射してください。


例) 月曜日の注射を忘れた場合

日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
	注射忘れ				忘れた分を注射	
8	9	10	11	12	13	14
		4日間以上の間隔をあける	新たな開始日			
15	16	17	18	19	20	21
			注射日			

その後は新たな開始日と同じ曜日に注射してください。

低血糖

アウィクリ®注投与による血糖値の推移(イメージ図)



投与後2～4日間に低血糖が多く認められました。

注射する単位は自己判断せず、必ず主治医の説明に従ってください。

アウィクリ®注が適する患者さん

- ・インスリンを毎日打ちたくないと拒否していた方
- ・介護者（訪問看護・家族）による、毎日の注射が困難な場合
- ・できるだけ注射の回数を減らしたい方…など



<編集後記>

ついに週1回のインスリンが発売されました！
新発売のくすりのため、長期処方では来年2月からとなりますのでお知りおきください。

発行元：市立三次中央病院

糖尿病療養指導チーム

文責：薬剤師（田畑貴康・中村武司）