

【肝-02】サイラムザ単独療法

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	フェキソフェナジン塩酸塩 OD 錠 60mg1 錠		点滴開始前に内服
薬剤 2	生食 100ml+デカトロン(3.3mg)1A		30 分で点滴
薬剤 3	サイラムザ 8mg/kg		生食 250ml(全量 250ml に調製)に混注し 60 分で点滴 ※忍容性が良好であれば 2 回目以降は 30 分まで短縮可
薬剤 4	生食 100ml		ルートフラッシュ用(初回は経過観察として 60 分で投与)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day14
サイラムザ	↓		休薬完了

【肝-03-1】AVA+テセントリク 1 回目(検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)	※輸液セットはシュアプラグ輸液セットを使用		
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	テセントリク	1200mg / body	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食	50ml	フラッシュ用、10 分間はテセントリクと同速度、 その後は全開
薬剤 4	アバスチン	15mg/kg	生食 100ml に混注し 90 分で点滴
薬剤 5	生食	100ml	ルートフラッシュ用

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
テセントリク	↓			休薬完了
アバスチン	↓			休薬完了

【肝-03-2】AVA+テセントリク 2 回目(検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	テセントリク	1200mg / body	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 3	生食	50ml	ルートフラッシュ用
薬剤 4	アバスチン	15mg/kg	生食 100ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 5	生食	100ml	ルートフラッシュ用

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
テセントリク	↓			休薬完了
アバスチン	↓			休薬完了

【肝-03-3】AVA＋テセントリク 3 回目以降(検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	テセントリク	1200mg / body	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 3	生食	50ml	ルートフラッシュ用
薬剤 4	アバスチン	15mg/kg	生食 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 5	生食	100ml	ルートフラッシュ用

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
テセントリク	↓			休薬完了
アバスチン	↓			休薬完了

【胆-01】M GEM／CDDP療法

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1,8)			
薬剤 1	ソルデム3	500ml	1時間で点滴
薬剤 2	パロセトン点滴用バッグ+デカロン 3.3mg2A		15分で点滴
薬剤 3	ランダ	25mg/m ²	生食 500ml(ーランダ量)に混注し 1 時間で点滴
薬剤 4	ゲムシタビン	1000mg/m ²	5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 5	生食	100ml	フラッシュ用

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
ランダ	↓	↓		休薬完了
ゲムシタビン	↓	↓		休薬完了

【胆-02】M GCS 療法

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	ソルデム3	500ml	1 時間で点滴
薬剤 2	パロセトン点滴用バッグ+デカロン	3.3mg2A	15 分で点滴
薬剤 3	ランダ	25mg/m ²	生食 500ml(ーランダ量)に混注し 1 時間で点滴
薬剤 4	ゲムシタビン	1000mg/m ²	5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 5	生食	100ml	フラッシュ用
薬剤 6	エスワン		1日2回朝夕食後内服(1 週間内服 1 週間休薬)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day14
ランダ	↓		休薬完了
ゲムシタビン	↓		休薬完了
エスワン	2×朝夕食後内服 Day1 の夕食後～Day8 の朝食後まで 1 週間内服し 1 週間休薬		

【胆-03-1】M GEM/CDDP 療法＋イミフィンジ(初回検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用(ルート確保後、廃棄)
薬剤 2	イミフィンジ	1500mg/body	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食	50ml	10 分で点滴(フラッシュ用)
薬剤 4	ソルデム3	500ml	1時間で点滴
薬剤 5	パロセトン点滴用バッグ+デカトロン 3.3mg2A		
			15 分で点滴
薬剤 6	ランダ	25mg/m ²	生食 500ml(ーランダ量)に混注し 1 時間で点滴
薬剤 7	ゲムシタビン	1000mg/m ²	5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 8	生食	100ml	フラッシュ用

(Day8)			
薬剤 1	ソルデム3	500ml	1時間で点滴
薬剤 2	パロセトン点滴用バッグ+デカトロン 3.3mg2A		
			15 分で点滴
薬剤 3	ランダ	25mg/m ²	生食 500ml(ーランダ量)に混注し 1 時間で点滴
薬剤 4	ゲムシタビン	1000mg/m ²	5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 5	生食	100ml	フラッシュ用

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
イミフィンジ	↓			休薬完了
ランダ	↓	↓		休薬完了
ゲムシタビン	↓	↓		休薬完了

【胆-03-2】M GEM/CDDP 療法＋イミフィンジ(2回目以降検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用(ルート確保後、廃棄)
薬剤 2	イミフィンジ	1500mg/body	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食	50ml	10 分で点滴(フラッシュ用)
薬剤 4	ソルデム3	500ml	1時間で点滴
薬剤 5	パロセトン点滴用バッグ+デカトロン 3.3mg2A		
			15 分で点滴
薬剤 6	ランダ	25mg/m ²	生食 500ml(ーランダ量)に混注し 1 時間で点滴
薬剤 7	ゲムシタビン	1000mg/m ²	5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 8	生食	100ml	フラッシュ用

(Day8)

薬剤 1	ソルデム3	500ml	1時間で点滴
薬剤 2	パロセトン点滴用バッグ+デカトロン 3.3mg2A		
			15 分で点滴
薬剤 3	ランダ	25mg/m ²	生食 500ml(ーランダ量)に混注し 1 時間で点滴
薬剤 4	ゲムシタビン	1000mg/m ²	5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 5	生食	100ml	フラッシュ用

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
イミフィンジ	↓			休薬完了
ランダ	↓	↓		休薬完了
ゲムシタビン	↓	↓		休薬完了

【胆-03a-1】M GEM/CDDP 療法＋イミフィンジ(≤30kg:検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用(ルート確保後、廃棄)
薬剤 2	イミフィンジ	20mg/kg	生食 100ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食	50ml	10 分で点滴(フラッシュ用)
薬剤 4	ソルデム3	500ml	1時間で点滴
薬剤 5	パロセトン点滴用バッグ+デカロン 3.3mg2A		
			15 分で点滴
薬剤 6	ランダ	25mg/m ²	生食 500ml(ーランダ量)に混注し 1 時間で点滴
薬剤 7	ゲムシタビン	1000mg/m ²	5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 8	生食	100ml	フラッシュ用

(Day8)

薬剤 1	ソルデム3	500ml	1時間で点滴
薬剤 2	パロセトン点滴用バッグ+デカロン 3.3mg2A		
			15 分で点滴
薬剤 3	ランダ	25mg/m ²	生食 500ml(ーランダ量)に混注し 1 時間で点滴
薬剤 4	ゲムシタビン	1000mg/m ²	5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 5	生食	100ml	フラッシュ用

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
イミフィンジ	↓			休薬完了
ランダ	↓	↓		休薬完了
ゲムシタビン	↓	↓		休薬完了

【胆-03a-2】M GEM/CDDP 療法＋イミフィンジ(≤30kg:検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用(ルート確保後、廃棄)
薬剤 2	イミフィンジ	20mg/kg	生食 100ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食	50ml	10 分で点滴(フラッシュ用)
薬剤 4	ソルデム3	500ml	1時間で点滴
薬剤 5	パロセトン点滴用バッグ+デカロン 3.3mg2A		
			15 分で点滴
薬剤 6	ランダ	25mg/m ²	生食 500ml(ーランダ量)に混注し 1 時間で点滴
薬剤 7	ゲムシタビン	1000mg/m ²	5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 8	生食	100ml	フラッシュ用

(Day8)

薬剤 1	ソルデム3	500ml	1時間で点滴
薬剤 2	パロセトン点滴用バッグ+デカロン 3.3mg2A		
			15 分で点滴
薬剤 3	ランダ	25mg/m ²	生食 500ml(ーランダ量)に混注し 1 時間で点滴
薬剤 4	ゲムシタビン	1000mg/m ²	5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 5	生食	100ml	フラッシュ用

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
イミフィンジ	↓			休薬完了
ランダ	↓	↓		休薬完了
ゲムシタビン	↓	↓		休薬完了

【胆-04】 イミフィンジ(2 回目以降検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	イミフィンジ	1500mg	生食 250ml に混注し、60 分かけて点滴
薬剤 3	生食	100ml	(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
イミフィンジ	↓				休薬完了

【胆-04a】 イミフィンジ(≦30kg:2 回目以降検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	イミフィンジ	20mg/kg	生食 100ml に混注し、60 分かけて点滴
薬剤 3	生食	100ml	(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
イミフィンジ	↓				休薬完了

【胆-05-1】M GEM/CDDP 療法＋キイトルーダ[®](初回検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用(ルート確保後、廃棄)
薬剤 2	キイトルーダ [®]	200mg / body	生食 50ml に溶解し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	50ml	キイトルーダ [®] 投与後フラッシュ用
薬剤 4	ソルデム3	500ml	1時間で点滴
薬剤 5	パロ/セロン点滴用バッグ+デカトロン 3.3mg2A		15 分で点滴
薬剤 6	ランダ	25mg/m ²	生食 500ml(ーランダ量)に混注し 1 時間で点滴
薬剤 7	ゲムシタビン	1000mg/m ²	5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 8	生食	100ml	フラッシュ用

(Day8)			
薬剤 1	ソルデム3	500ml	1時間で点滴
薬剤 2	パロ/セロン点滴用バッグ+デカトロン 3.3mg2A		15 分で点滴
薬剤 3	ランダ	25mg/m ²	生食 500ml(ーランダ量)に混注し 1 時間で点滴
薬剤 4	ゲムシタビン	1000mg/m ²	5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 5	生食	100ml	フラッシュ用

(Day1,8)

※ケモ当日は 500～1000ml 飲水すること！

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
キイトルーダ [®]	↓			休薬完了
ランダ	↓	↓		休薬完了
ゲムシタビン	↓	↓		休薬完了

【胆-05-2】M GEM/CDDP 療法＋キイトルーダ(2回目以降検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用(ルート確保後、廃棄)
薬剤 2	キイトルーダ	200mg / body	生食 50ml に溶解し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	50ml	キイトルーダ投与後フラッシュ用
薬剤 4	ソルデム3	500ml	1時間で点滴
薬剤 5	パロセトン点滴用バッグ+デカトロン 3.3mg2A		15 分で点滴
薬剤 6	ランダ	25mg/m ²	生食 500ml(ーランダ量)に混注し 1 時間で点滴
薬剤 7	ゲムシタビン	1000mg/m ²	5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 8	生食	100ml	フラッシュ用

(Day8)			
薬剤 1	ソルデム3	500ml	1時間で点滴
薬剤 2	パロセトン点滴用バッグ+デカトロン 3.3mg2A		15 分で点滴
薬剤 3	ランダ	25mg/m ²	生食 500ml(ーランダ量)に混注し 1 時間で点滴
薬剤 4	ゲムシタビン	1000mg/m ²	5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 5	生食	100ml	フラッシュ用

(Day1,8)

※ケモ当日は 500～1000ml 飲水すること！

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
キイトルーダ	↓			休薬完了
ランダ	↓	↓		休薬完了
ゲムシタビン	↓	↓		休薬完了

【胆-06】L GEM＋キイトルーダ(2 回目以降検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用(ルート確保後、廃棄)
薬剤 2	キイトルーダ	200mg / body	生食 50ml に溶解し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	50ml	キイトルーダ投与後フラッシュ用
薬剤 4	生食 100ml＋デカドロン 3.3mg × 1A		30 分で点滴
薬剤 5	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 6	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(Day8)			
薬剤 1	生食 100ml＋デカドロン 3.3mg × 1A		30 分で点滴
薬剤 2	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
キイトルーダ	↓			休薬完了
ゲムシタビン	↓	↓		休薬完了

【胆-07-1】Pembrolizumab(初回検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	キイトルーダ	200mg / body	生食 50ml に溶解し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
キイトルーダ	↓			休薬完了

【胆-07-2】Pembrolizumab(2 回目以降検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	キイトルーダ	200mg / body	生食 50ml に溶解し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
キイトルーダ	↓			休薬完了

【胆-07-3】キイトルーダ(6 週毎:初回検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	キイトルーダ	400mg / body	生食 50ml に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	...	Day42
キイトルーダ	↓				休薬完了

【胆-07-4】キイトルーダ(6 週毎:2 回目以降検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	キイトルーダ	400mg / body	生食 50ml に溶解し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	...	Day42
キイトルーダ	↓				休薬完了

【臍-01m】☆ mFOLFIRINOX 療法

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)	※点滴開始前にアプレピタント 125mg、フェキソフェナジン塩酸塩 OD 錠 60mg1 錠を内服		
薬剤 1	ハロ/セロン点滴バッグ 0.75mg＋デカドロン(3.3mg)3A		30 分で点滴
薬剤 2	オキサリプラチン	85mg/m ²	5%ブドウ糖 250ml に混注し 120 分で点滴
薬剤 3	【側管】レボホリナート	200mg/m ²	生食 250ml に混注し 120 分で点滴
薬剤 4	トポテシン	150mg/m ²	生食 250ml に混注し 120 分で点滴
	※薬剤 3 と薬剤 4 は同時に投与		
薬剤 5	フルオロウラシル	2,400mg/m ²	生食で希釈し 46 時間で投与
	※レフューザーポンプを使用し、埋込型カテーテルより投与		

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day14
オキサリプラチン	↓		休薬完了
レボホリナート	↓		
トポテシン	↓		
フルオロウラシル(持続ポンプ)	↓		

【膝-01】☆ FOLFIRINOX 療法

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)	※点滴開始前にアプレピタント 125mg、フェキソフェナジン塩酸塩 OD 錠 60mg1 錠を内服		
薬剤 1	パロセトロン点滴バッグ 0.75mg＋デカドロン(3.3mg)3A		30 分で点滴
薬剤 2	オキサリプラチン	85mg/m ²	5%ブドウ糖 250ml に混注し 120 分で点滴
薬剤 3	【側管】レボホリナート	200mg/m ²	生食 250ml に混注し 120 分で点滴
薬剤 4	トポテシン	180mg/m ²	生食 250ml に混注し 120 分で点滴
	※薬剤 3 と薬剤 4 は同時に投与		
薬剤 5	フルオウラシル	400mg/m ²	生食 100ml に混注し 10 分で投与
薬剤 6	フルオウラシル	2,400mg/m ²	生食で希釈し 46 時間で投与
	※トレフューザーポンプを使用し、埋込型カテーテルより投与		

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day14
オキサリプラチン	↓		休薬完了
レボホリナート	↓		
トポテシン	↓		
フルオウラシル(ボーラス)	↓		
フルオウラシル(持続ポンプ)	↓		

【腓-02】M アブラキサン＋GEM（100／800）

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1、8、15)			
薬剤 1	グラニセロンバッグ 3mg1 袋＋デカドロン(3.3mg)2A		30 分で点滴
薬剤 2	アブラキサン	100mg/m ²	30 分で点滴(生食に溶解し、ラベルに全量を記載)
薬剤 3	生食	50ml	全開(フラッシュ用)
薬剤 4	ゲムシタビン	800mg/m ²	5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 5	生食	50ml	全開(フラッシュ用)

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
アブラキサン	↓	↓	↓		休薬完了
ゲムシタビン	↓	↓	↓		

【臍-03】M GAS 療法

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	パロセトロン点滴バッグ	0.75mg	30 分で点滴
薬剤 2	アブラキサン	125mg/m ²	30 分で点滴(生食に溶解し、ラベルに全量を記載)
薬剤 3	生食	50ml	全開(フラッシュ用)
薬剤 4	ゲムシタビン	1000mg/m ²	5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 5	生食	50ml	全開(フラッシュ用)
薬剤 6	エスワン		1日2回朝夕食後内服(1週間内服 1 週間休薬)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day14
アブラキサン	↓		休薬完了
ゲムシタビン	↓		休薬完了
エスワン	1 週内服 1 週休薬		

【臍-04】M オニバイド+5-FU/LV

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	ハロ/セロン点滴用バッグ	0.75mg+デカロン(3.3mg)3A	30 分で点滴
薬剤 2	オニバイド	70mg/m ²	生食 500ml に混注し 90 分で点滴
薬剤 3	レボホリナート	200mg/m ²	生食 250ml に混注し 120 分で点滴
薬剤 4	フルオウラシル	2,400mg/m ²	生食で希釈し 46 時間で投与
※トレフューザーポンプを使用し、埋込型カテーテルより投与			

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day14
オニバイド	↓		休薬完了
レボホリナート	↓		
フルオウラシル(ポンプ)	↓		

【臍-05】☆ SOXIRI 療法

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
※点滴開始前にアプレピタント 125mg、フェキソフェナジン塩酸塩 OD 錠 60mg1 錠を内服			
薬剤 1	ハロ/セロン点滴バッグ	0.75mg+デカドロン(3.3mg)2A	30 分で点滴
薬剤 2	オキサリプラチン	85mg/m ² +デカドロン(3.3mg)1A	5%ブドウ糖 250ml に混注し 120 分で点滴
薬剤 3	トポテシン	150mg/m ²	生食 250ml に混注し 90 分で点滴
薬剤 4	生食	100ml	ルートフラッシュ用

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day14
オキサリプラチン	↓		休薬完了
トポテシン	↓		
エスワン	隔日内服		

【臍胆-01】L GEM+S-1 (2 投 1 休)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1、8)			
薬剤 1	生食 100ml+デカドロン 3.3mg × 1A		30 分で点滴
薬剤 2	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(Day1-14)

薬剤 1	エスワン	1日2回朝夕食後内服(2 週間内服 1 週間休薬)
------	------	---------------------------

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
ゲムシタビン	↓	↓		休薬完了
エスワン	Day1 より2週内服1週休薬			

【臍胆-02】L biweekly GEM 療法

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食 100ml+デカドロン 3.3mg × 1A		30 分で点滴
薬剤 2	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day14
ゲムシタビン	↓		休薬完了

【臍胆-03】L weekly GEM 療法 (S-1 併用)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1、8、15)			
薬剤 1	生食 100ml+デカドロン 3.3mg × 1A		30 分で点滴
薬剤 2	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(Day1-14)

薬剤 1	エスワン	1日2回朝夕食後内服(2 週間内服 2 週間休薬)
------	------	---------------------------

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
ゲムシタビン	↓	↓	↓		休薬完了
エスワン	2週内服 2 週休薬				

【臍胆-04】L weekly GEM 療法

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1、8、15)			
薬剤 1	生食 100ml+デカドロン 3.3mg × 1A		30 分で点滴
薬剤 2	ゲムシタビン 1000 mg/m ²		5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
ゲムシタビン	↓	↓	↓		休薬完了