

# 【食道-05】L 食道癌ドセタキセル

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

|        | 薬剤名                       | 投与量                 | 投与方法                  |
|--------|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| (Day1) |                           |                     |                       |
| 薬剤 1   | 生食 100ml+デカトロソ 3.3mg × 2A |                     | 30 分で点滴               |
| 薬剤 2   | ドセタキセル                    | 70mg/m <sup>2</sup> | 生食 250ml に混注し 1 時間で点滴 |
| 薬剤 3   | 生食                        | 100ml               | フラッシュ用                |

(投与スケジュールの図式)

| 使用薬剤   | Day1 | Day8 | Day15 | Day21 |
|--------|------|------|-------|-------|
| ドセタキセル | ↓    |      |       | 休薬完了  |

# 【食道-07-1】 Nivolumab240(初回検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

|        | 薬剤名   | 投与量        | 投与方法                               |
|--------|-------|------------|------------------------------------|
| (Day1) |       |            |                                    |
| 薬剤 1   | 生食    | 100ml      | フラッシュ用でルート確保                       |
| 薬剤 2   | オブジーボ | 240mg/body | 生食 100ml(全量 100ml に調製)に混注し、30 分で点滴 |
| 薬剤 3   | 生食    | 100ml      | 10 分で点滴(フラッシュ用)                    |

(投与スケジュールの図式)

| 使用薬剤  | Day1 | Day8 | Day14 |
|-------|------|------|-------|
| オブジーボ | ↓    |      | 休薬完了  |

## 【食道-07-2】 Nivolumab240(2 回目以降検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

|        | 薬剤名   | 投与量        | 投与方法                               |
|--------|-------|------------|------------------------------------|
| (Day1) |       |            |                                    |
| 薬剤 1   | 生食    | 100ml      | フラッシュ用でルート確保                       |
| 薬剤 2   | オブジーボ | 240mg/body | 生食 100ml(全量 100ml に調製)に混注し、30 分で点滴 |
| 薬剤 3   | 生食    | 100ml      | 10 分で点滴(フラッシュ用)                    |

(投与スケジュールの図式)

| 使用薬剤  | Day1 | Day8 | Day14 |
|-------|------|------|-------|
| オブジーボ | ↓    |      | 休薬完了  |

# 【食道-08】L Weekly パクリタキセル 6 投 1 休

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

|                      | 薬剤名                             | 投与量                  | 投与方法                             |
|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| (Day1、8、15、22、29、36) |                                 |                      |                                  |
| 薬剤 1                 | レスタミンコーワ5錠                      |                      | 点滴前に内服                           |
| 薬剤 2                 | 生食 100ml+デカトロソ(3.3mg)3A+ガスター 1A |                      | 30 分で点滴                          |
| 薬剤 3                 | パクリタキセル                         | 100mg/m <sup>2</sup> | 生食 250ml に混注し、60 分で点滴(初回は 120 分) |
| 薬剤 4                 | 生食                              | 100ml                | フラッシュ用                           |

(投与スケジュールの図式)

| 使用薬剤    | Day1 | Day8 | Day15 | Day22 | Day29 | Day36 | Day43 | Day49 |
|---------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| パクリタキセル | ↓    | ↓    | ↓     | ↓     | ↓     | ↓     |       | 休薬完了  |

# 【食道-09-1】☆ FP+オブジーボ(検査付 1 回目)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

|        | 薬剤名                               | 投与量                 | 投与方法                               |
|--------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| (Day1) |                                   |                     |                                    |
|        | ※側管投与の薬剤は 5-FU と同時投与              |                     |                                    |
| 薬剤 1   | 生食                                | 100ml               | ルート確保用                             |
| 薬剤 2   | オブジーボ                             | 240mg/body          | 生食 100ml(全量 100ml に調製)に混注し、30 分で点滴 |
| 薬剤 3   | 生食                                | 50ml                | ルートフラッシュ用                          |
| 薬剤 4   | グラニセロンバッグ 3mg+デカトロン(3.3mg)3A      |                     | 30 分で点滴                            |
| 薬剤 5   | ソルアセト F500ml+硫酸 Mg 補正液 8ml        |                     | 1時間で点滴                             |
|        | ※薬剤 6 開始前にアプレピタントカプセル 125mg を内服   |                     |                                    |
| 薬剤 6   | 【側管】生食                            | 500mL1 袋            | 90 分で点滴                            |
| 薬剤 7   | 【側管】ラシックス                         | 20mg1A              | ワンショット静注                           |
| 薬剤 8   | 【側管】ランダ                           | 70mg/m <sup>2</sup> | 生食 500ml(ーランダ量)に混注し2時間で点滴          |
| 薬剤 9   | 生食 1L1 袋+5-FU700mg/m <sup>2</sup> |                     | 24 時間持続点滴                          |

(Day2-5)

|      |                                   |          |           |
|------|-----------------------------------|----------|-----------|
|      | ※側管投与の生食は 5-FU と同時投与              |          |           |
| 薬剤 1 | 生食 1L1 袋+5-FU700mg/m <sup>2</sup> |          | 24 時間持続点滴 |
| 薬剤 2 | 【側管】生食                            | 500mL1 袋 | 120 分で点滴  |
| 薬剤 3 | 【側管】生食                            | 500mL1 袋 | 120 分で点滴  |

(Day15)

|      |       |            |                                    |
|------|-------|------------|------------------------------------|
| 薬剤 1 | 生食    | 100ml      | フラッシュ用でルート確保                       |
| 薬剤 2 | オブジーボ | 240mg/body | 生食 100ml(全量 100ml に調製)に混注し、30 分で点滴 |
| 薬剤 3 | 生食    | 100ml      | 10 分で点滴(フラッシュ用)                    |

(投与スケジュールの図式)

| 使用薬剤  | Day1 | Day2~5 | Day8 | Day15 | Day22 | Day28 |
|-------|------|--------|------|-------|-------|-------|
| オブジーボ | ↓    |        |      | ↓     |       | 休薬完了  |
| ランダ   | ↓    |        |      |       |       | 休薬完了  |
| 5-FU  | ↓    | ↓      |      |       |       | 休薬完了  |

# 【食道-09-2】☆ FP+オブジーボ(検査付 2 回目以降)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

|        | 薬剤名                                | 投与量                 | 投与方法                               |
|--------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| (Day1) |                                    |                     |                                    |
|        | ※側管投与の薬剤は 5-FU と同時投与               |                     |                                    |
| 薬剤 1   | 生食                                 | 100ml               | ルート確保用                             |
| 薬剤 2   | オブジーボ                              | 240mg/body          | 生食 100ml(全量 100ml に調製)に混注し、30 分で点滴 |
| 薬剤 3   | 生食                                 | 50ml                | ルートフラッシュ用                          |
| 薬剤 4   | グラニセロンバッグ 3mg+デカトロン(3.3mg)3A       |                     | 30 分で点滴                            |
| 薬剤 5   | ソルアセト F500ml+硫酸 Mg 補正液 8ml         |                     | 1時間で点滴                             |
|        | ※薬剤 6 開始前にアプレピタントカプセル 125mg を内服    |                     |                                    |
| 薬剤 6   | 【側管】生食                             | 500mL 1 袋           | 90 分で点滴                            |
| 薬剤 7   | 【側管】ラシックス 20mg1A                   |                     | ワンショット静注                           |
| 薬剤 8   | 【側管】ランダ                            | 70mg/m <sup>2</sup> | 生食 500ml(ーランダ量)に混注し2時間で点滴          |
| 薬剤 9   | 生食 1L 1 袋+5-FU700mg/m <sup>2</sup> |                     | 24 時間持続点滴                          |

(Day2-5)

|      |                                    |           |           |
|------|------------------------------------|-----------|-----------|
|      | ※側管投与の生食は 5-FU と同時投与               |           |           |
| 薬剤 1 | 生食 1L 1 袋+5-FU700mg/m <sup>2</sup> |           | 24 時間持続点滴 |
| 薬剤 2 | 【側管】生食                             | 500mL 1 袋 | 120 分で点滴  |
| 薬剤 3 | 【側管】生食                             | 500mL 1 袋 | 120 分で点滴  |

(Day15)

|      |       |            |                                    |
|------|-------|------------|------------------------------------|
| 薬剤 1 | 生食    | 100ml      | フラッシュ用でルート確保                       |
| 薬剤 2 | オブジーボ | 240mg/body | 生食 100ml(全量 100ml に調製)に混注し、30 分で点滴 |
| 薬剤 3 | 生食    | 100ml      | 10 分で点滴(フラッシュ用)                    |

(投与スケジュールの図式)

| 使用薬剤  | Day1 | Day2～5 | Day8 | Day15 | Day22 | Day28 |
|-------|------|--------|------|-------|-------|-------|
| オブジーボ | ↓    |        |      | ↓     |       | 休薬完了  |
| ランダ   | ↓    |        |      |       |       | 休薬完了  |
| 5-FU  | ↓    | ↓      |      |       |       | 休薬完了  |

# 【食道-10】L 5-FU+オブジーボ(2 回目以降検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

|        | 薬剤名                                  | 投与量        | 投与方法                               |
|--------|--------------------------------------|------------|------------------------------------|
| (Day1) |                                      |            |                                    |
| 薬剤 1   | 生食                                   | 100ml      | ルート確保用                             |
| 薬剤 2   | オブジーボ                                | 240mg/body | 生食 100ml(全量 100ml に調製)に混注し、30 分で点滴 |
| 薬剤 3   | 生食                                   | 50ml       | ルートフラッシュ用                          |
| 薬剤 4   | 生食 100mL + テカトロン(3.3mg)2A            |            | 30 分で点滴                            |
| 薬剤 5   | 生食 1L 1 袋 + 5-FU700mg/m <sup>2</sup> |            | 24 時間持続点滴                          |

(Day2-5)

|      |                                      |  |           |
|------|--------------------------------------|--|-----------|
| 薬剤 1 | 【側管】生食 100mL + テカトロン(3.3mg)2A        |  |           |
|      |                                      |  | 30 分で点滴   |
| 薬剤 2 | 生食 1L 1 袋 + 5-FU700mg/m <sup>2</sup> |  | 24 時間持続点滴 |

(Day15)

|      |       |            |                                    |
|------|-------|------------|------------------------------------|
| 薬剤 1 | 生食    | 100ml      | フラッシュ用でルート確保                       |
| 薬剤 2 | オブジーボ | 240mg/body | 生食 100ml(全量 100ml に調製)に混注し、30 分で点滴 |
| 薬剤 3 | 生食    | 100ml      | 10 分で点滴(フラッシュ用)                    |

(投与スケジュールの図式)

| 使用薬剤  | Day1 | Day2～5 | Day8 | Day15 | Day22 | Day28 |
|-------|------|--------|------|-------|-------|-------|
| オブジーボ | ↓    |        |      | ↓     |       | 休薬完了  |
| 5-FU  | ↓    | ↓      |      |       |       | 休薬完了  |