

【歯科-01-1】L アービタックス+PTX 療法(初回)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
※点滴開始前にレスタミンコーワ5錠を内服			
薬剤 1	生理食塩液	100mL+デカドロン(3.3mg)4A+ガスター 1A	30 分で点滴
薬剤 2	アービタックス	400mg/m ²	生食 500ml(ーアービタックス量 ml)に混注し2時間で点滴
※点滴開始 15 分 180ml/hr、Dr 立会い等、院内手順書に準じて施行すること			
薬剤 3	生食	100ml	1 時間で点滴(インフュージョンリアクション経過観察用)
薬剤 4	パクリタキセル	80mg/m ²	生食 250ml に混注し 2 時間で点滴
薬剤 5	生食	100ml	全開(ルートフラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day7
アービタックス	↓	休薬完了
パクリタキセル	↓	休薬完了

【歯科-01-2】L アービタックス+PTX療法(2回目以降)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
	※点滴開始前にレスタミンコーワ5錠を内服		
薬剤 1	生理食塩液	100mL+デカドロン(3.3mg)2A+ガスター 1A	30分で点滴
薬剤 2	アービタックス	250mg/m ²	生食 250ml(アービタックス量 ml)に混注し 1 時間で点滴
薬剤 3	生食	100ml	1 時間で点滴(インフュージョンリアクション経過観察用)
薬剤 4	パクリタキセル	80mg/m ²	生食 250ml に混注し 1 時間で点滴
薬剤 5	生食	100ml	全開(ルートフラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day7
アービタックス	↓	休薬完了
パクリタキセル	↓	休薬完了

【耳-10】M 外来カルボプラチン

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食 100ml+デカトロン(3.3mg)3A+ガスター1A		30 分で点滴
薬剤 2	グラニセトロンバッグ	1 袋	30 分で点滴
薬剤 3	カルボプラチン		生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 4	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

※カルボプラチンは 2.5AUC から開始。

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1
カルボプラチン	↓

【耳-11】L UFT+少量タキソテール(1/W)+RT

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食 100ml+デカトロン(3.3mg)2A+ガスター1A		30 分で点滴
薬剤 2	ドセタキセル	10mg/m ²	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day7
ドセタキセル	↓	休薬完了
ユーエフティE顆粒	3g/日	

【耳-13-1】☆ アービタックス+FP 療法(初回)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	フェキソフェナジン塩酸塩 OD 錠 60mg1 錠		アービタックス投与 30～60 分前に内服
薬剤 2	グラニセロンバッグ 3mg+デカドロン(3.3mg)3A+ガスター 1A		30 分で点滴
薬剤 3	アービタックス	400mg/m ²	生食 500ml(ーアービタックス量 ml)に混注し2時間で点滴
薬剤 4	アプレピタントカプセル 125mg 内服		ランダ開始 1～1.5 時間前に内服
薬剤 5	ソルアセト F500ml+硫酸 Mg 補正液 8ml		1時間で点滴(インフュージョンリアクション経過観察用)
薬剤 6	【側管】マンニトール 300ml		30 分で点滴
薬剤 7	【側管】ランダ	70mg/m ²	生食 500ml(ーランダ量)に混注し2時間で点滴
薬剤 8	ソルデム3 500ml 4袋+5-FU 700mg/m ²		24 時間持続点滴

(Day2-4)

薬剤 1	ソルデム3 500ml 4袋+5-FU 700mg/m ²	24 時間持続点滴
------	--	-----------

(Day8, 15)

薬剤 1	フェキソフェナジン塩酸塩 OD 錠 60mg1 錠	アービタックス投与 30～60 分前に内服
薬剤 2	生食 100ml+デカドロン(3.3mg)1A	30 分で点滴
薬剤 3	アービタックス	250mg/m ² 生食 250ml(ーアービタックス量 ml)に混注し 1 時間で点滴
薬剤 4	生食	100ml 1 時間で点滴(インフュージョンリアクション経過観察用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
アービタックス	↓	↓	↓	休薬完了
ランダ	↓			休薬完了
5-FU	↓			休薬完了

【耳-13-2】☆ アービタックス+FP 療法(2 回目以降)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	フェキサフェナジン塩酸塩 OD錠 60mg1錠		アービタックス投与 30～60 分前に内服
薬剤 2	グラニセロンバッグ 3mg+デカトロン(3.3mg)3A+ガスター 1A		30 分で点滴
薬剤 3	アービタックス	250mg/m ²	生食 250ml(ーアービタックス量 ml)に混注し 1 時間で点滴
薬剤 4	アプレピタントカプセル 125mg	内服	ランダ開始 1～1.5 時間前に内服
薬剤 5	ソルアセト F500ml+硫酸 Mg 補正液 8ml		1 時間で点滴(インフュージョンリアクション経過観察用)
薬剤 6	【側管】マンニトール 300ml		30 分で点滴
薬剤 7	【側管】ランダ	70mg/m ²	生食 500ml(ーランダ量)に混注し 2 時間で点滴
薬剤 8	ソルデム3 500ml 4袋+5-FU 700mg/m ²		24 時間持続点滴

(Day2-4)

薬剤 1 ソルデム3 500ml 4袋+5-FU 700mg/m² 24 時間持続点滴

(Day8, 15)

薬剤 1	フェキサフェナジン塩酸塩 OD錠 60mg1錠	アービタックス投与 30～60 分前に内服
薬剤 2	生食 100ml+デカトロン(3.3mg)1A	30 分で点滴
薬剤 3	アービタックス	250mg/m ² 生食 250ml(ーアービタックス量 ml)に混注し 1 時間で点滴
薬剤 4	生食	100ml 1 時間で点滴(インフュージョンリアクション経過観察用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
アービタックス	↓	↓	↓	休薬完了
ランダ	↓			休薬完了
5-FU	↓			休薬完了

【耳-14-1】アービタックス単独(初回)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	フェキソフェナジン塩酸塩 OD 錠 60mg1 錠		アービタックス投与 30～60 分前に内服
薬剤 2	生食 100mg+デカトロン(3.3mg)4A		30 分で点滴
薬剤 3	アービタックス	400mg/m ²	生食 500ml(ーアービタックス量 ml)に混注し 2 時間で点滴
薬剤 4	生食	100ml	60 分で点滴(インフュージョンリアクション経過観察用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day7
アービタックス	↓	休薬完了

【耳-14-2】アービタックス単独(2回目以降)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	フェキソフェナジン塩酸塩 OD 錠 60mg1 錠		アービタックス投与 30～60 分前に内服
薬剤 2	生食 100mg+デカトロン(3.3mg)1A		30 分で点滴
薬剤 3	アービタックス	250mg/m ²	生食 250ml(ーアービタックス量 ml)に混注し 1 時間で点滴
薬剤 4	生食	100ml	60 分で点滴(インフュージョンリアクション経過観察用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day7
アービタックス	↓	休薬完了

【耳-15-1】M アービタックス+PTX+CBDCA 療法(初回)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
	※点滴開始前にレスタミンコーワ5錠を内服		
薬剤 1	パロセロン点滴用バッグ	0.75mg+デカロン(3.3mg)4A+ガスター 1A	30 分で点滴
薬剤 2	アービタックス	400mg/m ²	生食 500ml(ーアービタックス量 ml)に混注し2時間で点滴
薬剤 3	生食	100ml	1 時間で点滴(インフュージョンリアクション経過観察用)
薬剤 4	パクリタキセル	200mg/m ²	生食 500ml に混注し3時間で点滴
薬剤 5	カルボプラチン	200mg/m ²	生食 250ml に混注し1時間で点滴
薬剤 6	生食	100ml	全開(ルートフラッシュ用)

(Day8, 15)

※点滴開始前にフェキソフェナジン塩酸塩 OD 錠 60mg1 錠を内服

薬剤 1	生食 100ml+デカロン(3.3mg)1A	30 分で点滴
薬剤 2	アービタックス	250mg/m ² 生食 250ml(ーアービタックス量 ml)に混注し 1 時間で点滴
薬剤 3	生食	100ml 1 時間で点滴(インフュージョンリアクション経過観察用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
アービタックス	↓	↓	↓	休薬完了
パクリタキセル	↓			休薬完了
カルボプラチン	↓			休薬完了

【耳-15-2】M アービタックス+PTX+CBDCA 療法(2 回目以降)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
	※点滴開始前にレスタミンコーワ5錠内服		
薬剤 1	パロセトロン点滴用バッグ	0.75mg+デカドロン(3.3mg)3A+ガスター 1A	30 分で点滴
薬剤 2	アービタックス	250mg/m ²	生食 250ml(ーアービタックス量 ml)に混注し 1 時間で点滴
薬剤 3	生食	100ml	1 時間で点滴(インフュージョンリアクション経過観察用)
薬剤 4	パクリタキセル	200mg/m ²	生食 500ml に混注し3時間で点滴
薬剤 5	カルボプラチン	200mg/m ²	生食 250ml に混注し1時間で点滴
薬剤 6	生食	100ml	全開(ルートフラッシュ用)

(Day8, 15)

	※点滴開始前にフェキソフェナジン塩酸塩 OD 錠 60mg1 錠を内服		
薬剤 1	生食 100ml+デカドロン(3.3mg)1A	30 分で点滴	
薬剤 2	アービタックス	250mg/m ²	生食 250ml(ーアービタックス量 ml)に混注し 1 時間で点滴
薬剤 3	生食	100ml	1 時間で点滴(インフュージョンリアクション経過観察用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
アービタックス	↓	↓	↓	休薬完了
パクリタキセル	↓			休薬完了
カルボプラチン	↓			休薬完了

【耳-16-1】☆ アービタックス+TPF 療法（初回）

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	フェキソフェナジン塩酸塩 OD 錠 60mg1 錠		薬剤 2 開始前に内服
薬剤 2	生食 100ml+デカドロン(3.3mg)4A +ガスター 1A		30 分で点滴
薬剤 3	アービタックス	400mg/m ²	生食 500ml(ーアービタックス量 ml)に混注し 2 時間で点滴
薬剤 4	生食	100ml	60 分で点滴(インフュージョンリアクション経過観察用)
薬剤 5	トセタキセル	60mg/m ²	生食 250ml に混注し、60 分で点滴
薬剤 6	ソルテム3 500ml 4袋+5-FU 700mg/m ²		24 時間持続点滴
(Day2-3)			
薬剤 1	ソルテム3 500ml 4袋+5-FU 700mg/m ²		24 時間持続点滴
(Day4)			
薬剤 1	ソルテム3 500ml 4袋+5-FU 700mg/m ²		24 時間持続点滴
薬剤 2	【側管】生食 100ml+デカドロン(3.3mg)3A+ガスター 1A		30 分で点滴
薬剤 3	アプレピタント	125mg	薬剤 4 開始前に内服
薬剤 4	【側管】グラニセロンハッグ 1 袋+硫酸 Mg 補正液 8ml		30 分で点滴
薬剤 5	【側管】マンニトール 1 袋		45 分で点滴
薬剤 6	【側管】ランダ	70mg/m ²	生食 500ml(ーランダ量)に混注し 60 分で点滴
(Day5)			
薬剤 1	アプレピタント	80mg	朝食後に内服
薬剤 2	生食 100ml+デカドロン(3.3mg)2A+ガスター 1A		30 分で点滴
薬剤 3	ソルテム3 500ml 4袋+5-FU 700mg/m ²		24 時間持続点滴
(Day6-7) ※day6 は朝食後にアプレピタント 80mg を内服			
薬剤 1	生食 100ml+デカドロン(3.3mg)2A+ガスター 1A		30 分で点滴
(Day8, 15) ※点滴開始前にフェキソフェナジン塩酸塩 OD 錠 60mg1 錠を内服			
薬剤 1	生食 100ml+デカドロン(3.3mg)1A		30 分で点滴
薬剤 2	アービタックス	250mg/m ²	生食 250ml(ーアービタックス量 ml)に混注し 1 時間で点滴
薬剤 3	生食	100ml	60 分で点滴(インフュージョンリアクション経過観察用)

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	...	Day8	...	Day15	Day21
アービタックス	↓						↓		↓	休薬完了
トセタキセル	↓									休薬完了
5-FU	↓	↓	↓	↓	↓					休薬完了
ランダ				↓						休薬完了

【耳-16-2】☆アービタックス+TPF 療法（2回目以降）

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	フェキソフェナジン塩酸塩 OD錠 60mg1錠		薬剤 2 開始前に内服
薬剤 2	生食 100ml+デカロン(3.3mg)2A +ガスター1A		30分で点滴
薬剤 3	アービタックス	250mg/m ²	生食 250ml(ーアービタックス量 ml)に混注し 1 時間で点滴
薬剤 4	生食	100ml	60 分で点滴(インフュージョンリアクション経過観察用)
薬剤 5	トセタキセル	60mg/m ²	生食 250ml に混注し、60 分で点滴
薬剤 6	ソルテム3 500ml4袋+5-FU700mg/m ²		24 時間持続点滴
(Day2-3)			
薬剤 1	ソルテム3 500ml4袋+5-FU700mg/m ²		24 時間持続点滴
(Day4)			
薬剤 1	ソルテム3 500ml4袋+5-FU700mg/m ²		24 時間持続点滴
薬剤 2	【側管】生食 100ml+デカロン(3.3mg)3A+ガスター1A		30 分で点滴
薬剤 3	アプレピタント 125mg		薬剤 4 開始前に内服
薬剤 4	【側管】グラニセロンバッグ 1 袋+硫酸 Mg 補正液 8m		30 分で点滴
薬剤 5	【側管】マンニトール 1 袋		45 分で点滴
薬剤 6	【側管】ランダ 70mg/m ²		生食 500ml(ーランダ量)に混注し 60 分で点滴
(Day5)			
薬剤 1	アプレピタント 80mg		朝食後に内服
薬剤 2	生食 100ml+デカロン(3.3mg)2A+ガスター 1A		30 分で点滴
薬剤 3	ソルテム3 500ml4袋+5-FU700mg/m ²		24 時間持続点滴
(Day6-7) ※day6 は朝食後にアプレピタント 80mg を内服			
薬剤 1	生食 100ml+デカロン(3.3mg)2A+ガスター 1A		30 分で点滴
(Day8, 15) ※点滴開始前にフェキソフェナジン塩酸塩 OD錠 60mg1錠を内服			
薬剤 1	生食 100ml+デカロン(3.3mg)1A		30 分で点滴
薬剤 2	アービタックス	250mg/m ²	生食 500ml(ーアービタックス量 ml)に混注し 1 時間で点滴
薬剤 3	生食	100ml	60 分で点滴(インフュージョンリアクション経過観察用)

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	...	Day8	...	Day15	Day21
アービタックス	↓						↓		↓	休薬完了
トセタキセル	↓									休薬完了
5-FU	↓	↓	↓	↓	↓					休薬完了
ランダ				↓						休薬完了

【耳-17-1】 Nivolumab240(初回検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	オブジーボ	240mg/body	生食 100ml(全量 100ml に調製)に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	10 分で点滴(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day14
オブジーボ	↓		休薬完了

【耳-17-2】 Nivolumab240(2 回目以降検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	オブジーボ	240mg/body	生食 100ml(全量 100ml に調製)に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	10 分で点滴(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day14
オブジーボ	↓		休薬完了

【耳-17-3】 オプジーボ 480(4 週毎:初回検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	オプジーボ	480mg/body	生食 100ml(全量 100ml に調製)に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	10 分で点滴(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	...	Day28
オプジーボ	↓		...	休薬完了

【耳-17-4】 オプジーボ 480(4 週毎:2 回目以降検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	オプジーボ	480mg/body	生食 100ml(全量 100ml に調製)に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	10 分で点滴(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	...	Day28
オプジーボ	↓		...	休薬完了

【耳-18】L Weekly パクリタキセル 6 投 1 休

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1、8、15、22、29、36)			
薬剤 1	レスタミンコーワ5錠		点滴前に内服
薬剤 2	生食 100ml+デカトロン(3.3mg)3A+ガスター 1A		30 分で点滴
薬剤 3	パクリタキセル	100mg/m ²	生食 250ml に混注し、60 分で点滴(初回は 120 分)
薬剤 4	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day29	Day36	Day43	Day49
パクリタキセル	↓	↓	↓	↓	↓	↓		休薬完了

【耳-22-1】 Pembrolizumab(初回検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	キイトルーダ	200mg / body	生食 50ml に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
キイトルーダ	↓			休薬完了

【耳-22-2】 Pembrolizumab(2 回目以降検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	キイトルーダ	200mg / body	生食 50ml に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
キイトルーダ	↓			休薬完了

【耳-22-3】キイトルーダ(6 週毎:初回検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	キイトルーダ	400mg / body	生食 50ml に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	...	Day42
キイトルーダ	↓				休薬完了

【耳-22-4】キイトルーダ(6 週毎:2 回目以降検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	キイトルーダ	400mg / body	生食 50ml に溶解し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	...	Day42
キイトルーダ	↓				休薬完了

【耳-23】M CBDCA+PTX

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
	※点滴開始前にレスタミンコーワ錠5錠を内服		
薬剤 1	生食 100ml+デカトロン(3.3mg)4A+ガスター1A		10 分で点滴
薬剤 2	パロセトロン点滴用バッグ	0.75mg	30 分で点滴
薬剤 3	パクリタキセル	175mg/m ²	生食 500ml に混注し 180 分で点滴
薬剤 4	カルボプラチン	AUC 5	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 5	生食	100ml	フラッシュ用

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
パクリタキセル	↓			休薬完了
カルボプラチン	↓			休薬完了

【耳-24-1】L ハーセプチン+ドセタキセル(初回)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	ハーセプチン	8mg/kg	生食 250ml に混注し 90 分で点滴
薬剤 3	生食 100ml+デカトロン(3.3mg)2A		30 分で点滴
薬剤 4	ドセタキセル	70mg/m ²	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 5	生食	100ml	フラッシュ用

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
ハーセプチン	↓			休薬完了
ドセタキセル	↓			休薬完了

【耳-24-2】L ハーセプチン+ドセタキセル(2回目以降)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	ハーセプチン	6mg/kg	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 3	生食 100ml+デカトロン(3.3mg)2A		30 分で点滴
薬剤 4	ドセタキセル	70mg/m ²	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 5	生食	100ml	フラッシュ用

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
ハーセプチン	↓			休薬完了
ドセタキセル	↓			休薬完了

【耳-25】 M Weekly CBDCA

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
	(Day1、8、15、22、29、36、43)		
薬剤 1	ゲラニセトロンパ`ック` 3mg1 袋	＋デ`カト`ロン(3. 3mg) 2A	30 分で点滴
薬剤 2	カルボプラチン	AUC 1. 5	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	フラッシュ用

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day29	Day36	Day43	Day49
カルボプラチン	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	休薬完了

【耳-25a】 M Weekly CBDCA（7 日クール）

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	ゲラニセトロンパ`ッ` 3mg1 袋	＋デ`カ`ロ`ン(3. 3mg) 2A	30 分で点滴
薬剤 2	カルボプラチン	AUC 1. 5	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	フラッシュ用

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day7
カルボプラチン	↓	休薬完了

（特記事項（使用上の注意など））

【耳-25】 M Weekly CBDCA の 7 日間レジメン