

【乳-01】M CMF療法

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1, 8)			
薬剤 1	グラニセロンバッグ 3mg	1 袋	30 分で点滴
薬剤 2	メソトレキセート	40 mg/m ²	生食 100ml に混注し、20 分で点滴
薬剤 3	5-FU	600 mg/m ²	生食 100ml に混注し、20 分で点滴
薬剤 4	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(Day1-14)

薬剤 1	エンドキサン錠 50mg	2T/日(<1.5 m ² /body) 3T(≥1.5 m ² /body)
朝食後に内服		

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
メソトレキセート	↓	↓			休薬完了
5-FU	↓	↓			休薬完了
エンドキサン錠 50mg	2 週内服		2 週休薬		休薬完了

【乳-02-1】☆EC(100)療法

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)	※点滴開始前にアプレピタント 125mg を内服		
薬剤 1	グラニセロンバッグ 3mg1 袋 + デカトロン(3.3mg)3A		30 分で点滴
薬剤 2	エピルビン	100 mg/m ²	生食 100ml に混注し、全開
薬剤 3	生食	50ml	全開(フラッシュ用)
薬剤 4	エンドキサン	600 mg/m ²	生食 100ml に混注し、30 分で点滴
薬剤 5	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
エピルビン	↓			休薬完了
エンドキサン	↓			休薬完了

【乳-02-2】EC(100)療法(アプレピタントなし)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	グラニセロンバッグ 3mg1 袋 + デカトロン(3.3mg)2A		30 分で点滴
薬剤 2	エピルビン	100 mg/m ²	生食 100ml に混注し、全開
薬剤 3	生食	50ml	全開(フラッシュ用)
薬剤 4	エンドキサン	600 mg/m ²	生食 100ml に混注し、30 分で点滴
薬剤 5	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
エピルビン	↓			休薬完了
エンドキサン	↓			休薬完了

【乳-02a-1】☆ ddEC 療法

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
	※点滴開始前にアプレピタント 125mg を内服		
薬剤 1	グラニセロンバッグ 3mg1 袋 + デカトロン(3.3mg)3A		30 分で点滴
薬剤 2	エピルビシン	90 mg/m ²	生食 100ml に混注し、全開
薬剤 3	生食	50ml	全開(フラッシュ用)
薬剤 4	エンドキサン	600 mg/m ²	生食 100ml に混注し、30 分で点滴
薬剤 5	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day14
エピルビシン	↓		休薬完了
エンドキサン	↓		休薬完了

【乳-03-1】☆ FEC(100)療法

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
	※点滴開始前にアプレピタント 125mg を内服		
薬剤 1	グラニセロンバッグ 3mg1 袋 + デカドロン(3.3mg)3A		30 分で点滴
薬剤 2	5-FU	500 mg/m ²	生食 100ml に混注し、15 分で点滴
薬剤 3	エピルビン	100 mg/m ²	生食 100ml に混注し、全開
薬剤 4	生食	50ml	全開(フラッシュ用)
薬剤 5	エンドキサン	500 mg/m ²	生食 100ml に混注し、30 分で点滴
薬剤 6	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
5-FU	↓			休薬完了
エピルビン	↓			休薬完了
エンドキサン	↓			休薬完了

【乳-03-2】FEC(100)療法（アプレピタントなし）

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	グラニセロンバッグ 3mg1 袋 + デカトロン(3.3mg)2A		30 分で点滴
薬剤 2	5-FU	500 mg/m ²	生食 100ml に混注し、15 分で点滴
薬剤 3	エピルビン	100 mg/m ²	生食 100ml に混注し、全開
薬剤 4	生食	50ml	全開（フラッシュ用）
薬剤 5	エンドキサン	500 mg/m ²	生食 100ml に混注し、30 分で点滴
薬剤 6	生食	100ml	全開（フラッシュ用）

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
5-FU	↓			休薬完了
エピルビン	↓			休薬完了
エンドキサン	↓			休薬完了

【乳-04】M TC療法

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	グラニセロンバッグ 3mg1 袋＋デカトロン(3.3mg)2A		30 分で点滴
薬剤 2	ドセタキセル	75mg/m ²	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	エンドキサン	600mg/m ²	生食 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 4	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
ドセタキセル	↓			休薬完了
エンドキサン	↓			休薬完了

【乳-05】L Weekly パクリタキセル 12 連投

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	レスタミンコーワ5錠		点滴前に内服
薬剤 2	生食 100ml+デカトロン(3.3mg)3A+ガスター 1A		30 分で点滴
薬剤 3	パクリタキセル	80mg/m ²	生食 250ml に混注し、60 分で点滴(初回は 120 分)
薬剤 4	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day7
パクリタキセル	↓	休薬完了

【乳-06】L Weekly パクリタキセル3投1休

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1, 8, 15)			
薬剤 1	レスタミンコーワ5錠		点滴前に内服
薬剤 2	生食 100ml+デカトロン(3.3mg)3A+ガスター 1A		30 分で点滴
薬剤 3	パクリタキセル	80mg/m ²	生食 250ml に混注し、60 分で点滴(初回は 120 分)
薬剤 4	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
パクリタキセル	↓	↓	↓		休薬完了

【乳-07-1】ハーセプチン3週毎（初回のみ）

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
薬剤 1	ハーセプチン	8mg/kg	生食 250ml に混注し 90 分で点滴
薬剤 2	生食	100ml	全開（フラッシュ用）

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
ハーセプチン	↓			休薬完了

【乳-07-2】ハーセプチン3週毎（2クール目以降）

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
薬剤 1	ハーセプチン	6mg/kg	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 2	生食	100ml	全開（フラッシュ用）

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
ハーセプチン	↓			休薬完了

【乳-07-T1】トラスツス`マブ`3週毎（初回のみ）

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
薬剤 1	トラスツス`マブ`	8mg/kg	生食 250ml に混注し 90 分で点滴
薬剤 2	生食	100ml	全開（フラッシュ用）

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
トラスツス`マブ`	↓			休薬完了

【乳-07-T2】トラスツス`マブ`3週毎(2クール目以降)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	トラスツス`マブ`	6mg/kg	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 2	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
トラスツス`マブ`	↓			休薬完了

【乳-08-1】ハーセプチン毎週（初回のみ）

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
薬剤 1	ハーセプチン	4mg/kg	生食 250ml に混注し 90 分で点滴
薬剤 2	生食	100ml	全開（フラッシュ用）

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day7
ハーセプチン	↓	休薬完了

【乳-08-2】ハーセプチン毎週（2クール目以降）

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
薬剤 1	ハーセプチン	2mg/ kg	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 2	生食	100ml	全開（フラッシュ用）

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day7
ハーセプチン	↓	休薬完了

【乳-08-T1】トラスツス`マブ`毎週（初回のみ）

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
薬剤 1	トラスツス`マブ`	4mg/kg	生食 250ml に混注し 90 分で点滴
薬剤 2	生食	100ml	全開（フラッシュ用）

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day7
トラスツス`マブ`	↓	休薬完了

【乳-08-T2】トラスツス`マブ`毎週（2クール目以降）

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
薬剤 1	トラスツス`マブ`	2mg/ kg	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 2	生食	100ml	全開（フラッシュ用）

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day7
トラスツス`マブ`	↓	休薬完了

【乳-09-1】L ハーセプチン+ドセタキセル(初回)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	ハーセプチン	4mg/kg	生食 250ml に混注し 90 分で点滴
薬剤 2	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(Day8)

薬剤 1	ハーセプチン	6mg/kg	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 2	生食 100ml+デカトロン(3.3mg)2A		30 分で点滴
薬剤 3	ドセタキセル	70mg/m ²	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 4	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
ハーセプチン	↓	↓			休薬完了
ドセタキセル		↓			休薬完了

【乳-09-2】L ハーセプチン+ドセタキセル(2クール目以降)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	ハーセプチン	6mg/kg	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 2	生食 100ml+デカトロン(3.3mg)2A		30 分で点滴
薬剤 3	ドセタキセル	70mg/m ²	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 4	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
ハーセプチン	↓			休薬完了
ドセタキセル	↓			休薬完了

【乳-09-T1】L トラスツス`マブ`+ドセタキセル(初回)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	トラスツス`マブ`	4mg/kg	生食 250ml に混注し 90 分で点滴
薬剤 2	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(Day8)			
薬剤 1	トラスツス`マブ`	6mg/kg	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 2	生食 100ml+デ`カ`ト`ロン(3.3mg)2A		30 分で点滴
薬剤 3	ドセタキセル	70mg/m ²	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 4	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
トラスツス`マブ`	↓	↓			休薬完了
ドセタキセル		↓			休薬完了

【乳-09-T2】L トラスツス`マフ`+ドセタキセル(2クール目以降)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	トラスツス`マフ`	6mg/kg	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 2	生食 100ml+デ`カ`ロン(3.3mg)2A		30 分で点滴
薬剤 3	ド`セ`タキセル	70mg/m ²	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 4	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
トラスツス`マフ`	↓			休薬完了
ド`セ`タキセル	↓			休薬完了

【乳-10-1】L ハーセプチン+wPTX3投1休(初回)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	ハーセプチン	4mg/kg	生食 250ml に混注し 90 分で点滴
薬剤 2	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(Day8, 15, 22)

薬剤 1	ハーセプチン	2mg/kg	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 2	レスタミンコーワ5錠		薬剤3開始前に内服
薬剤 3	生食 100ml+デカトロン(3.3mg)2A+ガスター1A		30 分で点滴
薬剤 4	パクリタキセル	80mg/kg	生食 250ml に混注し 60 分で点滴(初回は 120 分で点滴)
薬剤 5	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(Day29)

薬剤 1	ハーセプチン	2mg/kg	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 2	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day29	Day35
ハーセプチン	↓	↓	↓	↓	↓	休薬完了
パクリタキセル		↓	↓	↓		休薬完了

【乳-10-2】Lハーセプチン+wPTX3投1休(2クール目以降)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1, 8, 15)			
薬剤 1	ハーセプチン	2mg/kg	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 2	レスタミンコーワ5錠		薬剤3開始前に内 服
薬剤 3	生食 100ml+デカトロン(3.3mg)2A+ガスター1A		30 分で点滴
薬剤 4	パクリタキセル	80mg/m ²	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 5	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(Day22)

薬剤 1	ハーセプチン	2mg/kg	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 2	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
ハーセプチン	↓	↓	↓	↓	休薬完了
パクリタキセル	↓	↓	↓		休薬完了

【乳-10-T1】L トラスツス`マブ`+wPTX3投1休(初回)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	トラスツス`マブ`	4mg/kg	生食 250ml に混注し 90 分で点滴
薬剤 2	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(Day8, 15, 22)

薬剤 1	トラスツス`マブ`	2mg/kg	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 2	レスタミンコーワ5錠		薬剤3開始前に内服
薬剤 3	生食 100ml+デ`カ`ロン(3.3mg)2A+ガスター1A		30 分で点滴
薬剤 4	パ`ク`リ`タ`キ`セル	80mg/kg	生食 250ml に混注し 60 分で点滴(初回は 120 分で点滴)
薬剤 5	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(Day29)

薬剤 1	トラスツス`マブ`	2mg/kg	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 2	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day29	Day35
トラスツス`マブ`	↓	↓	↓	↓	↓	休薬完了
パ`ク`リ`タ`キ`セル		↓	↓	↓		休薬完了

【乳-10-T2】Lトラスツス`マブ`+wPTX3投 1 休(2クール目以降)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1, 8, 15)			
薬剤 1	トラスツス`マブ`	2mg/kg	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 2	レスタミンコーワ5錠		薬剤3開始前に内服
薬剤 3	生食 100ml+デ`カ`ロン(3.3mg)2A+ガ`スター1A		30 分で点滴
薬剤 4	パ`クリタキセル	80mg/m ²	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 5	生食	100ml	全開(フラッシュ用)
(Day22)			
薬剤 1	トラスツス`マブ`	2mg/kg	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 2	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
トラスツス`マブ`	↓	↓	↓	↓	休薬完了
パ`クリタキセル	↓	↓	↓		休薬完了

【乳-11-1】ハーセプチン+ビンレルビン(初回)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	ハーセプチン	4mg/kg	生食 250ml に混注し 90 分で点滴
薬剤 2	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(Day8, 15)			
薬剤 1	ハーセプチン	2mg/kg	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 2	ロゼウス	25mg/m ²	生食 50ml に混注し、全開で 10 分以内
薬剤 3	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(Day22)			
薬剤 1	ハーセプチン	2mg/kg	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 2	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
ハーセプチン	↓	↓	↓	↓	休薬完了
ロゼウス		↓	↓		休薬完了

【乳-11-2】ハーセプチン+ビンレルビン(2クール目以降)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1, 8)			
薬剤 1	ハーセプチン	2mg/kg	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 2	ロゼウス	25mg/m ²	生食 50ml に混注し、全開で 10 分以内
薬剤 3	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(Day15)

薬剤 1	ハーセプチン	2mg/kg	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 2	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
ハーセプチン	↓	↓	↓	休薬完了
ロゼウス	↓	↓		休薬完了

【乳-11-T1】トラスツス`マブ`+ビノレルビン(初回)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	トラスツス`マブ`	4mg/kg	生食 250ml に混注し 90 分で点滴
薬剤 2	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(Day8, 15)			
薬剤 1	トラスツス`マブ`	2mg/kg	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 2	ロゼウス	25mg/m ²	生食 50ml に混注し、全開で 10 分以内
薬剤 3	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(Day22)			
薬剤 1	トラスツス`マブ`	2mg/kg	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 2	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
トラスツス`マブ`	↓	↓	↓	↓	休薬完了
ロゼウス		↓	↓		休薬完了

【乳-11-T2】トラスツス`マブ`+ビノレルビン(2クール目以降)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1, 8)			
薬剤 1	トラスツス`マブ`	2mg/kg	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 2	ロゼウス	25mg/m ²	生食 50ml に混注し、全開で 10 分以内
薬剤 3	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(Day15)

薬剤 1	トラスツス`マブ`	2mg/kg	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 2	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
トラスツス`マブ`	↓	↓	↓	休薬完了
ロゼウス	↓	↓		休薬完了

【乳-12】L 3週毎ドセタキセル療法

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食 100ml+デカトロン(3.3mg)2A		30 分で点滴
薬剤 2	ドセタキセル	70mg/m ²	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
ドセタキセル	↓			休薬完了

【乳-13】L 3週毎パクリタキセル療法

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	レスタミンコーワ5錠		点滴前に内服
薬剤 2	生食 100ml+デカトロ [®] ン(3.3mg)4A+ガスター 1A		30 分で点滴
薬剤 4	パクリタキセル	175mg/m ²	生食 500ml に混注し、180 分で点滴
薬剤 5	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
パクリタキセル	↓			休薬完了

【乳-14】L weekly ドセタキセル3投1休

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1, 8, 15)			
薬剤 1	生食 100ml+デカトロ(3.3mg)2A		30 分で点滴
薬剤 2	ドセタキセル	30mg/m ²	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
ドセタキセル	↓	↓	↓		休薬完了

【乳-15】ビノレルビン療法

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1, 8)			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用
薬剤 2	ロゼウス	25mg/m ²	生食 50ml に混注し、全開で 10 分以内
薬剤 3	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
ロゼウス	↓	↓		休薬完了

【乳-16-1】M ハーセプチン+TC療法（初回のみ）

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
薬剤 1	ハーセプチン	8mg/kg	生食 250ml に混注し 90 分で点滴
薬剤 2	グラニセロンバッグ 3mg1 袋+デカドロン(3.3mg)3A		30 分で点滴
薬剤 3	ドセタキセル	75mg/m ²	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 4	エンドキサン	600mg/m ²	生食 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 5	生食	100ml	全開（フラッシュ用）

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
ハーセプチン	↓			休薬完了
ドセタキセル	↓			休薬完了
エンドキサン	↓			休薬完了

【乳-16-2】M ハーセプチン+TC療法(2クール目以降)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	ハーセプチン	6mg/kg	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 2	グラニセロンバッグ 3mg1 袋+デカトロン(3.3mg)2A		30 分で点滴
薬剤 3	ドセタキセル	75mg/m ²	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 4	エンドキサン	600mg/m ²	生食 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 5	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
ハーセプチン	↓			休薬完了
ドセタキセル	↓			休薬完了
エンドキサン	↓			休薬完了

【乳-16-T1】M トラスツスマブ+TC療法(初回のみ)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	トラスツスマブ	8mg/kg	生食 250ml に混注し 90 分で点滴
薬剤 2	グラニセロンバッグ 3mg1 袋+デカロン(3.3mg)3A		30 分で点滴
薬剤 3	ドセタキセル	75mg/m ²	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 4	エンドキサン	600mg/m ²	生食 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 5	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
トラスツスマブ	↓			休薬完了
ドセタキセル	↓			休薬完了
エンドキサン	↓			休薬完了

【乳-16-T2】Mトラスツスマブ+TC療法(2クール目以降)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	トラスツスマブ	6mg/kg	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 2	グラニセロンバッグ 3mg1 袋+デカトロン(3.3mg)2A		30 分で点滴
薬剤 3	ドセタキセル	75mg/m ²	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 4	エンドキサン	600mg/m ²	生食 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 5	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
トラスツスマブ	↓			休薬完了
ドセタキセル	↓			休薬完了
エンドキサン	↓			休薬完了

【乳-17-1】ハーセプチン＋wPTX12 連投(初回のみ)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	ハーセプチン	4mg/kg	生食 250ml に混注し 90 分で点滴
薬剤 2	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day7
ハーセプチン	↓	休薬完了

【乳-17-2】L ハーセプチン+wPTX12 連投(2 回目以降)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	ハーセプチン	2mg/kg	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 2	レスタミンコーワ5錠		薬剤3開始前に内服
薬剤 3	生食 100ml+デカトロン(3.3mg)2A+ガスター 1A		30 分で点滴
薬剤 4	パクリタキセル	80mg/m ²	生食 250ml に混注し 60 分で点滴(初回のみ 120 分)
薬剤 5	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day7
ハーセプチン	↓	休薬完了
パクリタキセル	↓	休薬完了

【乳-17-T1】トラスツス`マブ`+wPTX12 連投(初回のみ)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	トラスツス`マブ`	4mg/kg	生食 250ml に混注し 90 分で点滴
薬剤 2	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day7
トラスツス`マブ`	↓	休薬完了

【乳-17-T2】L トラスツス`マブ`+wPTX12 連投(2 回目以降)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	トラスツス`マブ`	2mg/kg	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 2	レスタミンコーワ5錠		薬剤3開始前に内服
薬剤 3	生食 100ml+デ`カ`ロ`ン(3.3mg)2A+ガ`ス`ター 1A		30 分で点滴
薬剤 4	パ`ク`リ`タ`キ`セル	80mg/m ²	生食 250ml に混注し 60 分で点滴(初回のみ 120 分)
薬剤 5	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day7
トラスツス`マブ`	↓	休薬完了
パ`ク`リ`タ`キ`セル	↓	休薬完了

【乳-18】L 3週毎アブラキサン療法

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食 100ml+デカトロン(3.3mg)2A		30 分で点滴
薬剤 2	アブラキサン	260mg/m ²	30 分で点滴(生食に溶解し、ラベルに全量を記載)
薬剤 3	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
アブラキサン	↓			休薬完了

【乳-19-1】L ハーセプチン+アブラキサン(初回)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	ハーセプチン	4mg/kg	生食 250ml に混注し 90 分で点滴
薬剤 2	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(Day8)

薬剤 1	ハーセプチン	6mg/kg	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 2	生食 100ml+デカトロン(3.3mg)2A		30 分で点滴
薬剤 3	アブラキサン	260mg/m ²	30 分で点滴(生食に溶解し、ラベルに全量を記載)
薬剤 4	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
ハーセプチン	↓	↓			休薬完了
アブラキサン		↓			休薬完了

【乳-19-2】L ハーセプチン+アブラキサン(2回目以降)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	ハーセプチン	6mg/kg	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 2	生食 100ml+デカトロン(3.3mg)2A		30 分で点滴
薬剤 3	アブラキサン	260mg/m ²	30 分で点滴(生食に溶解し、ラベルに全量を記載)
薬剤 4	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
ハーセプチン	↓			休薬完了
アブラキサン	↓			休薬完了

【乳-19-T1】L トラスツス`マブ`+アブラキサン(初回)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	トラスツス`マブ`	4mg/kg	生食 250ml に混注し 90 分で点滴
薬剤 2	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(Day8)			
薬剤 1	トラスツス`マブ`	6mg/kg	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 2	生食 100ml+デ`カ`ト`ロン(3.3mg)2A		30 分で点滴
薬剤 3	アブラキサン	260mg/m ²	30 分で点滴(生食に溶解し、ラベルに全量を記載)
薬剤 4	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
トラスツス`マブ`	↓	↓			休薬完了
アブラキサン		↓			休薬完了

【乳-19-T2】L トラスツス`マフ`+アブラキサン(2 回目以降)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	トラスツス`マフ`	6mg/kg	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 2	生食 100ml+デ`カト`ロン(3.3mg)2A		30 分で点滴
薬剤 3	アブラキサン	260mg/m ²	30 分で点滴(生食に溶解し、ラベルに全量を記載)
薬剤 4	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
トラスツス`マフ`	↓			休薬完了
アブラキサン	↓			休薬完了

【乳-20】L GT Weekly 療法

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1,8)			
薬剤 1	レスタミンコーワ5錠		点滴開始前に内服
薬剤 2	生食 100ml+デカトロン(3.3mg)3A+ガスター1A		30分で点滴
薬剤 3	パクリタキセル 80mg/m ²		生食 250ml に混注し 60 分で点滴(初回 120 分)
薬剤 4	ゲムシタビン 1250mg/m ²		5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 5	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
パクリタキセル	↓	↓		休薬完了
ゲムシタビン	↓	↓		休薬完了

【乳-21-1】L wPTX+アバスチン(1クール目)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1, 15)			
薬剤 1	アバスチン	10mg/kg	生食 100ml に混注し
※Day1 は 90 分、Day15 は 60 分で点滴			
薬剤 2	レスタミンコーワ5錠		薬剤 3 の点滴開始前に内服
薬剤 3	生食 100ml+デカトロン(3.3mg)3A+ガスター1A		30 分で点滴
薬剤 4	パクリタキセル	80mg/m ²	生食 250ml に混注し 60 分で点滴(初回のみ 120 分)
薬剤 5	生食	100ml	全開(ルートフラッシュ用)

(Day8)

薬剤 1	レスタミンコーワ5錠		薬剤 2 の点滴開始前に内服
薬剤 2	生食 100ml+デカトロン(3.3mg)3A+ガスター1A		30 分で点滴
薬剤 3	パクリタキセル	80mg/m ²	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 4	生食	100ml	全開(ルートフラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
アバスチン	↓		↓		休薬完了
パクリタキセル	↓	↓	↓		休薬完了

【乳-21-2】L wPTX+アバスチン(2クール目以降)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1, 15)			
薬剤 1	アバスチン	10mg/kg	生食 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 2	レスタミンコーワ5錠		薬剤 3 の点滴開始前に内服
薬剤 3	生食 100ml+デカトロン(3.3mg)3A+ガスター1A		30 分で点滴
薬剤 4	パクリタキセル	80mg/m ²	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 5	生食	100ml	全開(ルートフラッシュ用)

(Day8)

薬剤 1	レスタミンコーワ5錠		薬剤 2 の点滴開始前に内服
薬剤 2	生食 100ml+デカトロン(3.3mg)3A+ガスター1A		30 分で点滴
薬剤 3	パクリタキセル	80mg/m ²	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 4	生食	100ml	全開(ルートフラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
アバスチン	↓		↓		休薬完了
パクリタキセル	↓	↓	↓		休薬完了

【乳-22】L ハラヴェン

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1,8)			
薬剤 1	生食 100ml+デカドロン(3.3mg)2A		30 分で点滴
薬剤 2	ハラヴェン	1.4mg/m ²	生食 50ml に混注し5分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
ハラヴェン	↓	↓		休薬完了

【乳-23-1】L ハーセプチン＋ハラヴェン(初回)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	ハーセプチン	8mg/kg	生食 250ml に混注し 90 分で点滴
薬剤 2	生食 100ml+デカドロン(3.3mg)2A		全開で点滴
薬剤 3	ハラヴェン	1.4mg/m ²	生食 50ml に混注し5分で点滴
薬剤 4	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(Day8)

薬剤 1	生食 100ml+デカドロン(3.3mg)2A	30 分で点滴
薬剤 2	ハラヴェン 1.4mg/m ²	生食 50ml に混注し5分で点滴
薬剤 3	生食 100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
ハラヴェン	↓	↓		休薬完了
ハーセプチン	↓			休薬完了

【乳-23-2】L ハーセプチン+ハラヴェン(2回目以降)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	ハーセプチン	6mg/kg	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 2	生食 100ml+デカドロン(3.3mg)2A		全開で点滴
薬剤 3	ハラヴェン	1.4mg/m ²	生食 50ml に混注し5分で点滴
薬剤 4	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(Day8)			
薬剤 1	生食 100ml+デカドロン(3.3mg)2A		30 分で点滴
薬剤 2	ハラヴェン	1.4mg/m ²	生食 50ml に混注し5分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
ハラヴェン	↓	↓		休薬完了
ハーセプチン	↓			休薬完了

【乳-23-T1】Lハラヴェン+トラスツズマブ（初回）

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
薬剤 1	トラスツズマブ	8mg/kg	生食 250ml に混注し 90 分で点滴
薬剤 2	生食 100ml+デカドロン(3.3mg)2A		全開で点滴
薬剤 3	ハラヴェン	1.4mg/m ²	生食 50ml に混注し5分で点滴
薬剤 4	生食	100ml	全開（フラッシュ用）

（Day8）			
薬剤 1	生食 100ml+デカドロン(3.3mg)2A		30 分で点滴
薬剤 2	ハラヴェン	1.4mg/m ²	生食 50ml に混注し5分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	全開（フラッシュ用）

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
ハラヴェン	↓	↓		休薬完了
トラスツズマブ	↓			休薬完了

【乳-23-T2】L ハラヴェン+トラスツズマブ(2回目以降)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	トラスツズマブ	6mg/kg	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 2	生食 100ml+デカドロン(3.3mg)2A		全開で点滴
薬剤 3	ハラヴェン	1.4mg/m ²	生食 50ml に混注し5分で点滴
薬剤 4	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(Day8)			
薬剤 1	生食 100ml+デカドロン(3.3mg)2A		30 分で点滴
薬剤 2	ハラヴェン	1.4mg/m ²	生食 50ml に混注し5分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
ハラヴェン	↓	↓		休薬完了
トラスツズマブ	↓			休薬完了

【乳-24-1】L パージェタ＋ハーセプチン＋wPTX(初回)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食 100ml＋ソルメドロール注 125mg1V		30 分で点滴
薬剤 2	生食 100ml＋デカドロン(3.3mg)3A＋ガスター1A		30 分で点滴
薬剤 3	パージェタ	840mg	生食 250ml に混注し 1 時間で点滴
※薬剤 4 開始前にレスタミンコーワ錠5錠を内服			
薬剤 4	生食	100ml	経過観察(初回1時間)
薬剤 5	ハーセプチン	8mg/kg	生食 250ml に混注し 1 時間 30 分で点滴
薬剤 6	生食	100ml	全開(フラッシュ用)
薬剤 7	パクリタキセル	80mg/m ²	生食 250ml に混注し2時間で点滴
薬剤 8	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(Day8, 15)

※薬剤 1 開始前にレスタミンコーワ錠5錠を内服

薬剤 1	生食 100ml＋デカドロン(3.3mg)3A＋ガスター1A		30 分で点滴
薬剤 2	パクリタキセル	80mg/m ²	生食 250ml に混注し 1 時間で点滴
薬剤 3	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
パージェタ	↓			休薬完了
ハーセプチン	↓			休薬完了
パクリタキセル	↓	↓	↓	休薬完了

【乳-24-2】L パージェタ＋ハーセプチン＋wPTX(2 回目以降)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
	※経過観察用生食 100ml でルート確保		
薬剤 1	パージェタ	420mg	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 2	生食	100ml	経過観察(30 分に短縮可)
薬剤 3	ハーセプチン	6mg/kg	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
	※薬剤 4 開始前にレスタミンコーワ錠5錠を内服		
薬剤 4	生食 100ml＋デカトロン(3.3mg)3A＋ガスター1A		30 分で点滴
薬剤 5	パクリタキセル	80mg/m ²	生食 250ml に混注し 1 時間で点滴
薬剤 6	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(Day8, 15)			
	※薬剤 1 開始前にレスタミンコーワ錠5錠を内服		
薬剤 1	生食 100ml＋デカトロン(3.3mg)3A＋ガスター1A		30 分で点滴
薬剤 2	パクリタキセル	80mg/m ²	生食 250ml に混注し 1 時間で点滴
薬剤 3	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
パージェタ	↓			休薬完了
ハーセプチン	↓			休薬完了
パクリタキセル	↓	↓	↓	休薬完了

【乳-24-T1】L パージェタ+トラスツス`マブ`+wPTX(初回)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食 100ml+ソルメドロール注 125mg1V		30 分で点滴
薬剤 2	生食 100ml+デ`カ`ロン(3.3mg)3A+ガ`スター-1A		30 分で点滴
薬剤 3	パージェタ	840mg	生食 250ml に混注し 1 時間で点滴
※薬剤 4 開始前にレスタミンコーワ錠5錠を内服			
薬剤 4	生食	100ml	経過観察(初回1時間)
薬剤 5	トラスツス`マブ`	8mg/kg	生食 250ml に混注し 1 時間 30 分で点滴
薬剤 6	生食	100ml	全開(フラッシュ用)
薬剤 7	パクリタキセル	80mg/m ²	生食 250ml に混注し2時間で点滴
薬剤 8	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(Day8, 15)

※薬剤 1 開始前にレスタミンコーワ錠5錠を内服

薬剤 1	生食 100ml+デ`カ`ロン(3.3mg)3A+ガ`スター-1A		30 分で点滴
薬剤 2	パクリタキセル	80mg/m ²	生食 250ml に混注し 1 時間で点滴
薬剤 3	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
パージェタ	↓			休薬完了
トラスツス`マブ`	↓			休薬完了
パクリタキセル	↓	↓	↓	休薬完了

【乳-24-T2】L パージェタ+トラスツスマブ+wPTX(2回目以降)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
	※経過観察用生食 100ml でルート確保		
薬剤 1	パージェタ	420mg	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 2	生食	100ml	経過観察(30 分に短縮可)
薬剤 3	トラスツスマブ	6mg/kg	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
	※薬剤 4 開始前にレスタミンコーワ錠5錠を内服		
薬剤 4	生食 100ml+デカドロン(3.3mg)3A+ガスター-1A		30 分で点滴
薬剤 5	パクリタキセル	80mg/m ²	生食 250ml に混注し 1 時間で点滴
薬剤 6	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(Day8, 15)

	※薬剤 1 開始前にレスタミンコーワ錠5錠を内服		
薬剤 1	100ml+デカドロン(3.3mg)3A+ガスター-1A		30 分で点滴
薬剤 2	リタキセル	80mg/m ²	生食 250ml に混注し 1 時間で点滴
薬剤 3	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
パージェタ	↓			休薬完了
トラスツスマブ	↓			休薬完了
パクリタキセル	↓	↓	↓	休薬完了

【乳-25-1】L パージェタ＋ハーセプチン＋3 週毎 DOC(初回)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食 100ml＋ソルメドロール注 125mg1V		30 分で点滴
薬剤 2	生食 100ml＋デカトロン(3.3mg)3A＋ガスター1A		30 分で点滴
薬剤 3	パージェタ	840mg	生食 250ml に混注し 1 時間で点滴
※薬剤 4 開始前にフェキソフェナジン塩酸塩 OD 錠 60mg1 錠を内服			
薬剤 4	生食	100ml	経過観察(初回1時間)
薬剤 5	ハーセプチン	8mg/kg	生食 250ml に混注し 1 時間 30 分で点滴
薬剤 6	生食	100ml	全開(フラッシュ用)
薬剤 7	ドセタキセル	75mg/m ²	生食 250ml に混注し 1 時間で点滴
薬剤 8	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
パージェタ	↓			休薬完了
ハーセプチン	↓			休薬完了
ドセタキセル	↓			休薬完了

【乳-25-2】L パージェタ+ハーセプチン+3 週毎 DOC(2 回目以降)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
	※経過観察用生食 100ml でルート確保		
薬剤 1	パージェタ	420mg	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 2	生食	100ml	経過観察(30 分に短縮可)
薬剤 3	ハーセプチン	6mg/kg	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 4	生食 100ml+デカトロ [®] ン(3.3mg)2A		30 分で点滴
薬剤 5	ドセタキセル	75mg/m ²	生食 250ml に混注し 1 時間で点滴
薬剤 6	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
パージェタ	↓			休薬完了
ハーセプチン	↓			休薬完了
ドセタキセル	↓			休薬完了

【乳-25-T1】L パージェタ+トラスツスマブ+3 週毎 DOC(初回)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食 100ml+ソルメドロール注 125mg1V		30 分で点滴
薬剤 2	生食 100ml+デカトロン(3.3mg)3A+ガスター-1A		30 分で点滴
薬剤 3	パージェタ	840mg	生食 250ml に混注し 1 時間で点滴
※薬剤 4 開始前にフェキシフェナジン塩酸塩 OD 錠 60mg1 錠を内服			
薬剤 4	生食	100ml	経過観察(初回1時間)
薬剤 5	トラスツスマブ	8mg/kg	生食 250ml に混注し 1 時間 30 分で点滴
薬剤 6	生食	100ml	全開(フラッシュ用)
薬剤 7	ドセタキセル	75mg/m ²	生食 250ml に混注し 1 時間で点滴
薬剤 8	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
パージェタ	↓			休薬完了
トラスツスマブ	↓			休薬完了
ドセタキセル	↓			休薬完了

【乳-25-T2】L パージェタ+トラスツズマブ+3 週毎 DOC(2 回目以降)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
	※経過観察用生食 100ml でルート確保		
薬剤 1	パージェタ	420mg	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 2	生食	100ml	経過観察(30 分に短縮可)
薬剤 3	トラスツズマブ	6mg/kg	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 4	生食 100ml+デカロン(3.3mg)2A		30 分で点滴
薬剤 5	ドセタキセル	75mg/m ²	生食 250ml に混注し 1 時間で点滴
薬剤 6	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
パージェタ	↓			休薬完了
トラスツズマブ	↓			休薬完了
ドセタキセル	↓			休薬完了

【乳-26-1】 パージェタ+ハーセプチン(初回)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食 100ml+ソルメドロール注 125mg1V		30 分で点滴
薬剤 2	生食 100ml+デカドロン(3.3mg)3A+ガスター1A		30 分で点滴
薬剤 3	パージェタ	840mg	生食 250ml に混注し 1 時間で点滴
※薬剤 4 開始前にフェキソフェナジン塩酸塩 OD 錠 60mg1 錠を内服			
薬剤 4	生食	100ml	経過観察(初回1時間)
薬剤 5	ハーセプチン	8mg/kg	生食 250ml に混注し 1 時間 30 分で点滴
薬剤 6	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
パージェタ	↓			休薬完了
ハーセプチン	↓			休薬完了

【乳-26-2】 パージェタ＋ハーセプチン(2 回目以降)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
	※経過観察用生食 100ml でルート確保		
薬剤 1	パージェタ	420mg	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 2	生食	100ml	経過観察(30 分に短縮可)
薬剤 3	ハーセプチン	6mg/kg	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 4	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
パージェタ	↓			休薬完了
ハーセプチン	↓			休薬完了

【乳-26-T1】 パージェタ+トラスツズマブ(初回)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食 100ml+ソルメドロール注 125mg1V		30 分で点滴
薬剤 2	生食 100ml+デカロン(3.3mg)3A+ガスター1A		30 分で点滴
薬剤 3	パージェタ	840mg	生食 250ml に混注し 1 時間で点滴
※薬剤 4 開始前にフェキソフェナジン塩酸塩 OD 錠 60mg1 錠を内服			
薬剤 4	生食	100ml	経過観察(初回1時間)
薬剤 5	トラスツズマブ	8mg/kg	生食 250ml に混注し 1 時間 30 分で点滴
薬剤 6	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
パージェタ	↓			休薬完了
トラスツズマブ	↓			休薬完了

【乳-26-T2】 パージェタ+トラスツズマブ(2 回目以降)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
	※経過観察用生食 100ml でルート確保		
薬剤 1	パージェタ	420mg	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 2	生食	100ml	経過観察(30 分に短縮可)
薬剤 3	トラスツズマブ	6mg/kg	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 4	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
パージェタ	↓			休薬完了
トラスツズマブ	↓			休薬完了

【乳-27-1】 パージェタ＋ハーセプチン＋ビノレルビン(初回)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml＋ソルメドロール注 125mg1V	30 分で点滴
薬剤 2	生食	100ml＋デカロン(3.3mg)3A＋ガスター1A	30 分で点滴
薬剤 3	パージェタ	840mg	生食 250ml に混注し 1 時間で点滴
※薬剤 4 開始前にフェキソフェナジン塩酸塩 OD 錠 60mg1 錠を内服			
薬剤 4	生食	100ml	経過観察用(1時間)
薬剤 5	ハーセプチン	8mg/kg	生食 250ml に混注し 1 時間 30 分で点滴
薬剤 6	生食	100ml	ナベルビン投与前の上腕部加温時間確保用
薬剤 7	ロゼウス	25mg/m ²	生食 50ml に混注。ポンプは使用せずに全開で投与
薬剤 8	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(Day8)

薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用
薬剤 2	ロゼウス	25mg/m ²	生食 50ml に混注。ポンプは使用せずに全開で投与
薬剤 3	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
パージェタ	↓			休薬完了
ハーセプチン	↓			休薬完了
ロゼウス	↓	↓		休薬完了

【乳-27-2】 パーージェタ＋ハーセプチン＋ビナルビン(2回目以降)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
	※経過観察用生食 100ml でルート確保		
薬剤 1	パーージェタ	420mg	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 2	生食	100ml	経過観察用(初回の忍容性よければ 30 分)
薬剤 3	ハーセプチン	6mg/kg	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 4	生食	100ml	ナベルビン投与前の上腕部加温時間確保用
薬剤 5	ロゼウス	25mg/m ²	生食 50ml に混注。ポンプは使用せずに全開で投与
薬剤 6	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(Day8)			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用
薬剤 2	ロゼウス	25mg/m ²	生食 50ml に混注。ポンプは使用せずに全開で投与
薬剤 3	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
パーージェタ	↓			休薬完了
ハーセプチン	↓			休薬完了
ロゼウス	↓	↓		休薬完了

【乳-27-T1】 パージェタ+トラスツスマブ+ビルルビン(初回)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml+ソルメドロール注 125mg1V	30 分で点滴
薬剤 2	生食	100ml+デカロン(3.3mg)3A+カスター1A	30 分で点滴
薬剤 3	パージェタ	840mg	生食 250ml に混注し 1 時間で点滴
※薬剤 4 開始前にフェキシフェナジン塩酸塩 OD 錠 60mg1 錠を内服			
薬剤 4	生食	100ml	経過観察用(1時間)
薬剤 5	トラスツスマブ	8mg/kg	生食 250ml に混注し 1 時間 30 分で点滴
薬剤 6	生食	100ml	ナベルビン投与前の上腕部加温時間確保用
薬剤 7	ロゼウス	25mg/m ²	生食 50ml に混注。ポンプは使用せずに全開で投与
薬剤 8	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(Day8)

薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用
薬剤 2	ロゼウス	25mg/m ²	生食 50ml に混注。ポンプは使用せずに全開で投与
薬剤 3	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
パージェタ	↓			休薬完了
トラスツスマブ	↓			休薬完了
ロゼウス	↓	↓		休薬完了

【乳-27-T2】 パーージェタ+トラスツス`マブ`+ビ`ルルビン(2 回目以降)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
	※経過観察用生食 100ml でルート確保		
薬剤 1	パーージェタ	420mg	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 2	生食	100ml	経過観察用(初回の忍容性よければ 30 分)
薬剤 3	トラスツス`マブ`	6mg/kg	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 4	生食	100ml	ナベルビン投与前の上腕部加温時間確保用
薬剤 5	ロゼウス	25mg/m ²	生食 50ml に混注。ポンプは使用せずに全開で投与
薬剤 6	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(Day8)			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用
薬剤 2	ロゼウス	25mg/m ²	生食 50ml に混注。ポンプは使用せずに全開で投与
薬剤 3	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
パーージェタ	↓			休薬完了
トラスツス`マブ`	↓			休薬完了
ロゼウス	↓	↓		休薬完了

【乳-28-1】L パージェタ+ハーセプチン+ハラヴェン(初回)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml+ソルメドロール注 125mg1V	30 分で点滴
薬剤 2	生食	100ml+デカトロン(3.3mg)3A+ガスター1A	30 分で点滴
薬剤 3	パージェタ	840mg	生食 250ml に混注し 1 時間で点滴
※薬剤 4 開始前にフェキソフェナジン塩酸塩 OD 錠 60mg1 錠を内服			
薬剤 4	生食	100ml	経過観察用(1時間)
薬剤 5	ハーセプチン	8mg/kg	生食 250ml に混注し 1 時間 30 分で点滴
薬剤 6	生食	100ml	全開(フラッシュ用)
薬剤 7	ハラヴェン	1.4mg/m ²	生食 50ml に混注。ポンプは使用せずに全開で投与
薬剤 8	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(Day8)

薬剤 1	生食	100ml+デカトロン(3.3mg)2A	30 分で点滴
薬剤 2	ハラヴェン	1.4mg/m ²	生食 50ml に混注。ポンプは使用せずに全開で投与
薬剤 3	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
パージェタ	↓			休薬完了
ハーセプチン	↓			休薬完了
ハラヴェン	↓	↓		休薬完了

【乳-28-2】L パージェタ＋ハーセプチン＋ハラヴェン(2 回目以降)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
	※経過観察用生食 100ml でルート確保		
薬剤 1	パージェタ	420mg	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 2	生食	100ml	経過観察用(初回の忍容性よければ 30 分)
薬剤 3	ハーセプチン	6mg/kg	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 4	生食 100ml＋デカトロン(3.3mg)2A		30 分で点滴
薬剤 5	ハラヴェン	1.4mg/m ²	生食 50ml に混注。ポンプは使用せずに全開で投与
薬剤 6	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(Day8)			
薬剤 1	生食 100ml＋デカトロン(3.3mg)2A		30 分で点滴
薬剤 2	ハラヴェン	1.4mg/m ²	生食 50ml に混注。ポンプは使用せずに全開で投与
薬剤 3	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
パージェタ	↓			休薬完了
ハーセプチン	↓			休薬完了
ハラヴェン	↓	↓		休薬完了

【乳-28-T1】L パージエタ+トラスツスマブ+ハラヴェン(初回)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食 100ml+ソルメドロール注	125mg1V	30 分で点滴
薬剤 2	生食 100ml+デカトン(3.3mg)3A+ガスター-1A		30 分で点滴
薬剤 3	パージエタ	840mg	生食 250ml に混注し 1 時間で点滴
※薬剤 4 開始前にフェキソフェナジン塩酸塩 OD 錠 60mg1 錠を内服			
薬剤 4	生食	100ml	経過観察用(1時間)
薬剤 5	トラスツスマブ	8mg/kg	生食 250ml に混注し 1 時間 30 分で点滴
薬剤 6	生食	100ml	全開(フラッシュ用)
薬剤 7	ハラヴェン	1.4mg/m ²	生食 50ml に混注。ポンプは使用せずに全開で投与
薬剤 8	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(Day8)

薬剤 1	生食 100ml+デカトン(3.3mg)2A	30 分で点滴
薬剤 2	ハラヴェン	1.4mg/m ² 生食 50ml に混注。ポンプは使用せずに全開で投与
薬剤 3	生食	100ml 全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
パージエタ	↓			休薬完了
トラスツスマブ	↓			休薬完了
ハラヴェン	↓	↓		休薬完了

【乳-28-T2】L パージェタ+トラスツスマブ+ハラヴェン(2 回目以降)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
	※経過観察用生食 100ml でルート確保		
薬剤 1	パージェタ	420mg	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 2	生食	100ml	経過観察用(初回の忍容性よければ 30 分)
薬剤 3	トラスツスマブ	6mg/kg	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 4	生食 100ml+デカトロン(3.3mg)2A		30 分で点滴
薬剤 5	ハラヴェン	1.4mg/m ²	生食 50ml に混注。ポンプは使用せずに全開で投与
薬剤 6	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(Day8)			
薬剤 1	生食 100ml+デカトロン(3.3mg)2A		30 分で点滴
薬剤 2	ハラヴェン	1.4mg/m ²	生食 50ml に混注。ポンプは使用せずに全開で投与
薬剤 3	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
パージェタ	↓			休薬完了
トラスツスマブ	↓			休薬完了
ハラヴェン	↓	↓		休薬完了

【乳-29】L カドサイラ

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食 100ml+デカドロン(3.3mg)2A		30 分で点滴
薬剤 2	カドサイラ	3.6mg/kg	生食 250ml に混注し 90 分で点滴
※初回投与の忍容性が良好の場合 30 分まで短縮可			
薬剤 3	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
カドサイラ	↓			休薬完了

【乳-30-1】L nabPTX+テセントリク(検査付 1 回目)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1、15)			
薬剤 1	生食	100ml	メインフラッシュ用でルート確保
薬剤 2	テセントリク	840mg / body	生食 250ml に混注し 60 分(Day15 は 30 分)で点滴
薬剤 3	生食	100ml	テセントリクと同速度でフラッシュ
薬剤 4	【側管】生食	100ml	側管フラッシュ用でプライミング
薬剤 5	【側管】アブラキサン	100 mg/m ²	30 分で点滴(生食に溶解し、ラベルに全量を記載)
薬剤 6	【側管】生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(Day8)

薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	アブラキサン	100 mg/m ²	30 分で点滴(生食に溶解し、ラベルに全量を記載)
薬剤 3	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
テセントリク	↓		↓		休薬完了
アブラキサン	↓	↓	↓		休薬完了

【乳-30-2】L nabPTX+テセントリク(検査付 2 回目以降)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1、15)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	テセントリク	840mg / body	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	テセントリクと同速度でフラッシュ
薬剤 4	【側管】生食	100ml	側管フラッシュ用でプライミング
薬剤 5	【側管】アブラキサン	100 mg/m ²	30 分で点滴(生食に溶解し、ラベルに全量を記載)
薬剤 6	【側管】生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(Day8)

薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	アブラキサン	100 mg/m ²	30 分で点滴(生食に溶解し、ラベルに全量を記載)
薬剤 3	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
テセントリク	↓		↓		休薬完了
アブラキサン	↓	↓	↓		休薬完了

【乳-31】テセントリク(検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	テセントリク	840mg / body	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day14
テセントリク	↓		休薬完了

【乳-32】M CPT-11

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1,8,15)			
薬剤 1	グラニセロンバッグ 3mg1 袋＋デカドロン 3.3mg × 2A		30 分で点滴
薬剤 2	トポテシン	100mg/m ²	生食 500ml に混注し 90 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
トポテシン	↓	↓	↓		休薬完了

【乳-33-1】L PTX+キイトルーダ(検査付 1 回目)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1, 43, 64)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	キイトルーダ	200mg / body	生食 50ml に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	50ml	キイトルーダ投与後フラッシュ用
※薬剤 4 開始前にレスタミンコーワ 5 錠内服			
薬剤 4	生食 100ml+デカトロン(3.3mg)3A+ガスター 1A		30 分で点滴
薬剤 5	パクリタキセル	90mg/m ²	生食 250ml に混注し、60 分で点滴(初回は 120 分)
薬剤 6	生食	100ml	フラッシュ用

(Day8, 15, 29, 36, 57, 71)

薬剤 1	レスタミンコーワ5錠		点滴前に内服
薬剤 2	生食 100ml+デカトロン(3.3mg)3A+ガスター 1A		30 分で点滴
薬剤 3	パクリタキセル	90mg/m ²	生食 250ml に混注し、60 分で点滴
薬剤 4	生食	100ml	フラッシュ用

(Day22)

薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	キイトルーダ	200mg / body	生食 50ml に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	フラッシュ用

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day29	Day36	Day43	Day50	Day57	Day64	Day71	Day78	Day84
キイトルーダ	↓			↓			↓			↓			休薬完了
パクリタキセル	↓	↓	↓		↓	↓	↓		↓	↓	↓		休薬完了

【乳-33-2】L PTX+キイトルーダ(検査付 2 回目以降)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1, 43, 64)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	キイトルーダ	200mg / body	生食 50ml に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	50ml	キイトルーダ投与後フラッシュ用
※薬剤 4 開始前にレスタミンコーワ 5 錠内服			
薬剤 4	生食 100ml+デカトロン(3.3mg)3A+ガスター 1A		30 分で点滴
薬剤 5	ハクリタキセル	90mg/m ²	生食 250ml に混注し、60 分で点滴
薬剤 6	生食	100ml	フラッシュ用

(Day8, 15, 29, 36, 57, 71)

薬剤 1	レスタミンコーワ5錠		点滴前に内服
薬剤 2	生食 100ml+デカトロン(3.3mg)3A+ガスター 1A		30 分で点滴
薬剤 3	ハクリタキセル	90mg/m ²	生食 250ml に混注し、60 分で点滴
薬剤 4	生食	100ml	フラッシュ用

(Day22)

薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	キイトルーダ	200mg / body	生食 50ml に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	フラッシュ用

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day29	Day36	Day43	Day50	Day57	Day64	Day71	Day78	Day84
キイトルーダ	↓			↓			↓			↓			休薬完了
ハクリタキセル	↓	↓	↓		↓	↓	↓		↓	↓	↓		休薬完了

【乳-34-1】L nabPTX+キイトルーダ(検査付 1 回目)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1, 43, 64)			
薬剤 1	生食	100ml	メインフラッシュ用でルート確保
薬剤 2	キイトルーダ	200mg / body	生食 50ml に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	キイトルーダ投与後フラッシュ用
薬剤 4	【側管】生食	100ml	側管フラッシュ用でプライミング
薬剤 5	【側管】アブラキサン	100 mg/m ²	30 分で点滴(生食に溶解し、ラベルに全量を記載)
薬剤 6	【側管】生食	100ml	側管フラッシュ用

(Day8, 15, 29, 36, 57, 71)

薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	アブラキサン	100 mg/m ²	30 分で点滴(生食に溶解し、ラベルに全量を記載)
薬剤 3	生食	100ml	フラッシュ用

(Day22)

薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	キイトルーダ	200mg / body	生食 50ml に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	フラッシュ用

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day29	Day36	Day43	Day50	Day57	Day64	Day71	Day78	Day84
キイトルーダ	↓			↓			↓			↓			休薬完了
アブラキサン	↓	↓	↓		↓	↓	↓		↓	↓	↓		休薬完了

【乳-34-2】L nabPTX+キイトルーダ(検査付 2 回目以降)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1, 43, 64)			
薬剤 1	生食	100ml	メインフラッシュ用でルート確保
薬剤 2	キイトルーダ	200mg / body	生食 50ml に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	キイトルーダ投与後フラッシュ用
薬剤 4	【側管】生食	100ml	側管フラッシュ用でプライミング
薬剤 5	【側管】アブラキサン	100 mg/m ²	30 分で点滴(生食に溶解し、ラベルに全量を記載)
薬剤 6	【側管】生食	100ml	側管フラッシュ用

(Day8, 15, 29, 36, 57, 71)

薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	アブラキサン	100 mg/m ²	30 分で点滴(生食に溶解し、ラベルに全量を記載)
薬剤 3	生食	100ml	フラッシュ用

(Day22)

薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	キイトルーダ	200mg / body	生食 50ml に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	フラッシュ用

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day29	Day36	Day43	Day50	Day57	Day64	Day71	Day78	Day84
キイトルーダ	↓			↓			↓			↓			休薬完了
アブラキサン	↓	↓	↓		↓	↓	↓		↓	↓	↓		休薬完了

【乳-35-1】M GEM+CBDCA+キイトルーダ(初回検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	キイトルーダ	200mg / body	生食 50ml に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	50ml	キイトルーダ投与後フラッシュ用
薬剤 4	グラニセロンバッグ 3mg+デカトロン(3.3mg)3A		30 分で点滴
薬剤 5	カルボプラチン	AUC2	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 6	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 7	生食	100ml	フラッシュ用

(Day8)			
薬剤 1	グラニセロンバッグ 3mg+デカトロン(3.3mg)3A		30 分で点滴
薬剤 2	カルボプラチン	AUC2	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 4	生食	100ml	フラッシュ用

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
キイトルーダ	↓			休薬完了
カルボプラチン	↓	↓		休薬完了
ゲムシタビン	↓	↓		休薬完了

【乳-35-2】M GEM＋CBDCA＋キイトルーダ[®](2 回目以降検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	キイトルーダ [®]	200mg / body	生食 50ml に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	50ml	キイトルーダ投与後フラッシュ用
薬剤 4	グラニセロンバッグ 3mg＋デカトロン(3.3mg)3A		30 分で点滴
薬剤 5	カルボプラチン	AUC2	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 6	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 7	生食	100ml	フラッシュ用

(Day8)			
薬剤 1	グラニセロンバッグ 3mg＋デカトロン(3.3mg)3A		30 分で点滴
薬剤 2	カルボプラチン	AUC2	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 4	生食	100ml	フラッシュ用

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
キイトルーダ [®]	↓			休薬完了
カルボプラチン	↓	↓		休薬完了
ゲムシタビン	↓	↓		休薬完了

【乳-36】 Pembrolizumab(2 回目以降検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	キイトルーダ	200mg / body	生食 50ml に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
キイトルーダ	↓			休薬完了

【乳-37-1】M ハーセプチン+CBDCA+DTX（初回）

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	ハーセプチン	8mg/kg	生食 250ml に混注し 90 分で点滴
薬剤 3	パロセトロン点滴用バッグ 0.75mg+デカトロン(3.3mg)3A		30 分で点滴
薬剤 4	カルボプラチン	AUC6	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 5	ドセタキセル	75 mg/m ²	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 6	生食	100ml	フラッシュ用

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
ハーセプチン	↓			休薬完了
カルボプラチン	↓			休薬完了
ドセタキセル	↓			休薬完了

【乳-37-2】M ハーセプチン+CBDCA+DTX (2 回目以降)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	ハーセプチン	6mg/kg	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 3	パロセトロン点滴用バッグ 0.75mg+デカドロン(3.3mg)3A		30 分で点滴
薬剤 4	カルボプラチン	AUC6	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 5	ドセタキセル	75 mg/m ²	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 6	生食	100ml	フラッシュ用

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
ハーセプチン	↓			休薬完了
カルボプラチン	↓			休薬完了
ドセタキセル	↓			休薬完了

【乳-37-T1】M トラスツス`マブ`+CBDCA+DTX（初回）

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	トラスツス`マブ`	8mg/kg	生食 250ml に混注し 90 分で点滴
薬剤 3	パロセトロン点滴用バッグ 0.75mg+デ`カト`ロン(3.3mg)3A		30 分で点滴
薬剤 4	カルボプラチン	AUC6	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 5	ドセタキセル	75 mg/m ²	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 6	生食	100ml	フラッシュ用

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
トラスツス`マブ`	↓			休薬完了
カルボプラチン	↓			休薬完了
ドセタキセル	↓			休薬完了

【乳-37-T2】Mトラスツス`マブ`+CBDCA+DTX (2回目以降)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	トラスツス`マブ`	6mg/kg	生食 250mlに混注し 30 分で点滴
薬剤 3	パロセトロン点滴用バッグ 0.75mg+デ`カト`ロン(3.3mg)3A		30 分で点滴
薬剤 4	カルボプラチン	AUC6	生食 250mlに混注し 60 分で点滴
薬剤 5	ドセタキセル	75 mg/m ²	生食 250mlに混注し 60 分で点滴
薬剤 6	生食	100ml	フラッシュ用

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
トラスツス`マブ`	↓			休薬完了
カルボプラチン	↓			休薬完了
ドセタキセル	↓			休薬完了

【乳-38】M エンハーツ

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	パロセトン点滴用バッグ	0.75mg+デカドン(3.3mg)2A	30 分で点滴
薬剤 2	5%ブドウ糖	100ml	グラニセロン投与後フラッシュ用
※エンハーツ投与中は点滴バッグを遮光			
薬剤 3	エンハーツ	5.4mg/kg	5%ブドウ糖 100ml に混注し 90 分で点滴
薬剤 4	5%ブドウ糖	100ml	ルートフラッシュ用

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
エンハーツ	↓			休薬完了

【乳-39】☆ AC 療法

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)	※点滴開始前にアプレピタント 125mg を内服		
薬剤 1	パロセトン点滴用バッグ 0.75mg1 袋	＋デカロン(3.3mg)3A	30 分で点滴
薬剤 2	ドキソルビシン	60 mg/m ²	生食 100ml に混注し、全開
薬剤 3	生食	50ml	全開(フラッシュ用)
薬剤 4	エンドキサン	600 mg/m ²	生食 100ml に混注し、30 分で点滴
薬剤 5	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
ドキソルビシン	↓			休薬完了
エンドキサン	↓			休薬完了

【乳-40-1】M CBDCA+PTX+キイトルーダ(初回検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	キイトルーダ	200mg / body	生食 50ml に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	50ml	キイトルーダ投与後フラッシュ用
※点滴開始前にレスタミンコーワ 5 錠を内服			
薬剤 4	生食 100ml+デカトロン(3.3mg)2A+ガスター 1A		10 分で点滴
薬剤 5	グラニセロンバッグ	3mg1 袋	30 分で点滴
薬剤 6	パクリタキセル	80mg/m ²	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 7	カルボプラチン	AUC 1.5	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 8	生食	100ml	10 分(フラッシュ用)

(Day8、15)

※点滴開始前にレスタミンコーワ 5 錠を内服

薬剤 1	生食 100ml+デカトロン(3.3mg)2A+ガスター 1A	10 分で点滴
薬剤 2	グラニセロンバッグ	30 分で点滴
薬剤 3	パクリタキセル	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 4	カルボプラチン	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 5	生食	10 分(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
キイトルーダ	↓			休薬完了
パクリタキセル	↓	↓	↓	休薬完了
カルボプラチン	↓	↓	↓	休薬完了

【乳-40-2】M CBDCA+PTX+キイトルーダ(2回目以降検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤2	キイトルーダ	200mg / body	生食 50ml に混注し、30 分で点滴
薬剤3	生食	50ml	キイトルーダ投与後フラッシュ用
※点滴開始前にレスタミンコーワ 5 錠を内服			
薬剤4	生食 100ml+デカトロン(3.3mg)2A+ガスター 1A		10 分で点滴
薬剤5	グラニセロンバッグ	3mg1 袋	30 分で点滴
薬剤6	パクリタキセル	80mg/m ²	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤7	カルボプラチン	AUC 1.5	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
薬剤8	生食	100ml	10 分(フラッシュ用)

(Day8、15)

※点滴開始前にレスタミンコーワ 5 錠を内服

薬剤1	生食 100ml+デカトロン(3.3mg)2A+ガスター 1A		10 分で点滴
薬剤2	グラニセロンバッグ	3mg1 袋	30 分で点滴
薬剤3	パクリタキセル	80mg/m ²	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤4	カルボプラチン	AUC 1.5	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
薬剤5	生食	100ml	10 分(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
キイトルーダ	↓			休薬完了
パクリタキセル	↓	↓	↓	休薬完了
カルボプラチン	↓	↓	↓	休薬完了

【乳-41-1】☆ AC 療法＋キイトルーダ(初回検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
	※点滴開始前にアプレピタント 125mg を内服		
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	キイトルーダ	200mg / body	生食 50ml に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	50ml	キイトルーダ投与後フラッシュ用
薬剤 4	ハロセロン点滴静注バッグ 0.75mg1 袋 ＋デカロン(3.3mg)3A		30 分で点滴
薬剤 5	ドキシルビシン	60 mg/m ²	生食 100ml に混注し、全開
薬剤 6	生食	50ml	全開(フラッシュ用)
薬剤 7	エンドキサン	600 mg/m ²	生食 100ml に混注し、30 分で点滴
薬剤 8	生食	100ml	全開(フラッシュ用)
(Day2、3)			
薬剤 1	アプレピタントカプセル 80mg	1Cap	1 × 朝食後に内服

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
キイトルーダ	↓			休薬完了
ドキシルビシン	↓			休薬完了
エンドキサン	↓			休薬完了

【乳-41-2】☆ AC療法＋キイトルーダ(2回目以降検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
	※点滴開始前にアプレピタント 125mg を内服		
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	キイトルーダ	200mg / body	生食 50ml に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	50ml	キイトルーダ投与後フラッシュ用
薬剤 4	ハロセロン点滴静注バッグ 0.75mg1 袋 ＋デカロン(3.3mg)3A		30 分で点滴
薬剤 5	ドキシソビシン	60 mg/m ²	生食 100ml に混注し、全開
薬剤 6	生食	50ml	全開(フラッシュ用)
薬剤 7	エンドキサン	600 mg/m ²	生食 100ml に混注し、30 分で点滴
薬剤 8	生食	100ml	全開(フラッシュ用)
(Day2、3)			
薬剤 1	アプレピタントカプセル 80mg	1Cap	1 × 朝食後に内服

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
キイトルーダ	↓			休薬完了
ドキシソビシン	↓			休薬完了
エンドキサン	↓			休薬完了

【乳-42-1】Pembrolizumab(初回検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	キイトルーダ	200mg / body	生食 50ml に溶解し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
キイトルーダ	↓			休薬完了

【乳-42-2】Pembrolizumab(2 回目以降検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	キイトルーダ	200mg / body	生食 50ml に溶解し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
キイトルーダ	↓			休薬完了

【乳-42-3】キイトルーダ(6 週毎:初回検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	キイトルーダ	400mg / body	生食 50ml に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	...	Day42
キイトルーダ	↓				休薬完了

【乳-42-4】キイトルーダ(6 週毎:2 回目以降検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	キイトルーダ	400mg / body	生食 50ml に溶解し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	...	Day42
キイトルーダ	↓				休薬完了

【乳-43】L GEM

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1、8)			
薬剤 1	生食 100ml+デカドロン(3.3mg)1A		30 分で点滴
薬剤 2	ゲムシタビン	1250 mg/m ²	5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
ゲムシタビン	↓	↓		休薬完了