

【皮膚-02-1】 Nivolumab240(初回検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day 1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	オプジーボ	240mg/body	生食 100ml (全量 100ml に調製) に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	10 分で点滴 (フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day14
オプジーボ	↓		休薬完了

【皮膚-02-2】 Nivolumab240 (2 回目以降検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day 1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	オプジーボ	240mg/body	生食 100ml (全量 100ml に調製) に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	10 分で点滴 (フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day14
オプジーボ	↓		休薬完了

【皮膚-02-3】 オプジーボ 480(4 週毎：初回検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day 1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	オプジーボ	480mg/body	生食 100ml (全量 100ml に調製) に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	10 分で点滴 (フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	...	Day28
オプジーボ	↓		...	休薬完了

【皮膚-02-4】 オプジーボ 480 (4 週毎 : 2 回目以降検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day 1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	オプジーボ	480mg/body	生食 100ml (全量 100ml に調製) に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	10 分で点滴 (フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	...	Day28
オプジーボ	↓		...	休薬完了

【皮膚-03-1】 Pembrolizumab (初回検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day 1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	キイトルーダ	200mg/body	生食 50ml に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
キイトルーダ	↓			休薬完了

【皮膚-03-2】 Pembrolizumab (2 回目以降検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day 1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	キイトルーダ	200mg/body	生食 50ml に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
キイトルーダ	↓			休薬完了

【皮膚-03-3】キイトルーダ(6 週毎：初回検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day 1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	キイトルーダ	400mg/body	生食 50ml に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	...	Day42
キイトルーダ	↓				休薬完了

【皮膚-03-4】キイトルーダ(6週毎：2回目以降検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day 1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	キイトルーダ	400mg/body	生食 50ml に溶解し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	…	Day42
キイトルーダ	↓				休薬完了