

【軟部-01】M GEM+DOC 併用療法

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	グラニセロンバッグ 3mg+デカトン(3.3mg)2A		30分で点滴
薬剤 2	ゲムシタビン	800mg/m ²	5%ブドウ糖 100ml に混注し 30分で点滴
薬剤 3	ドセタキセル	70mg/m ²	生食 250ml に混注し 1時間で点滴
薬剤 4	生食	100ml	ルートフラッシュ用

(Day8)

薬剤 1	生食 100ml+デカトン(3.3mg)1A		30分で点滴
薬剤 2	ゲムシタビン	800mg/m ²	5%ブドウ糖 100ml に混注し 30分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	ルートフラッシュ用

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
ゲムシタビン	↓	↓		休薬完了
ドセタキセル	↓			休薬完了

【軟部-02】L ハラヴェン

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1,8)			
薬剤 1	生食 100ml+デカドロン(3.3mg)2A		30分で点滴
薬剤 2	ハラヴェン	1.4mg/m ²	生食 50ml に混注し5分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
ハラヴェン	↓	↓		休薬完了

【軟部-03】M ADM 単独療法

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	グラニセロンバッグ 3mg1 袋+デカトロン(3.3mg)2A		30 分で点滴
薬剤 2	ドキシソルビシン	70mg/m ²	生食 100ml に混注し全開で投与
薬剤 3	生食	100ml	フラッシュ用

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
ドキシソルビシン	↓			休薬完了