

【肺非-01】M CBDCA+PTX (weekly)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	レスタミンコーワ5錠		パクリタキセル投与 30 分前に内服終了
薬剤 2	生食 100ml+デカドロン(3.3mg)3A+ガスター 1A		10 分で点滴
薬剤 3	ハロノセロン点滴用バッグ 0.75mg		30 分で点滴
薬剤 4	パクリタキセル 80mg/m ²		生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 5	カルボプラチン AUC 6		生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 6	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(Day8、15)

薬剤 1	レスタミンコーワ5錠		パクリタキセル投与 30 分前に内服終了
薬剤 2	生食 100ml+デカドロン(3.3mg)3A+ガスター 1A		30 分で点滴
薬剤 3	パクリタキセル 80 mg/m ²		生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 4	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
パクリタキセル	↓	↓	↓		休薬完了
カルボプラチン	↓				休薬完了

【肺非-01-A1】M CBDCA+PTX(weekly)+BEV(1 回目)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	レスタミンコーワ5錠		パクリタキセル投与 30 分前に内服終了
薬剤 2	生食 100ml+デカトロン(3.3mg)3A+ガスター 1A		10 分で点滴
薬剤 3	パロセトロン点滴用バッグ 0.75mg		30 分で点滴
薬剤 4	パクリタキセル 80mg/m ²		生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 5	カルボプラチン AUC 6		生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 6	ベバシズマブ 15mg/kg		生食 100ml に混注し 90 分で点滴
薬剤 7	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(Day8、15)

薬剤 1	レスタミンコーワ5錠		パクリタキセル投与 30 分前に内服終了
薬剤 2	生食 100ml+デカトロン(3.3mg) 3A+ガスター 1A		30 分で点滴
薬剤 3	パクリタキセル 80mg/m ²		生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 4	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
パクリタキセル	↓	↓	↓		休薬完了
カルボプラチン	↓				休薬完了
ベバシズマブ	↓				休薬完了

【肺非-01-A2】M CBDCA+PTX(weekly)+BEV(2 回目)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	レスタミンコーワ5錠		パクリタキセル投与 30 分前に内服終了
薬剤 2	生食 100ml+デカトロン(3.3mg)3A+ガスター 1A		10 分で点滴
薬剤 3	パロセトロン点滴用バッグ 0.75mg		30 分で点滴
薬剤 4	パクリタキセル 80mg/m ²		生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 5	カルボプラチン AUC 6		生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 6	ベバシズマブ 15mg/kg		生食 100ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 7	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(Day8、15)

薬剤 1	レスタミンコーワ5錠		パクリタキセル投与 30 分前に内服終了
薬剤 2	生食 100ml+デカトロン(3.3mg) 3A+ガスター 1A		30 分で点滴
薬剤 3	パクリタキセル 80mg/m ²		生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 4	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
パクリタキセル	↓	↓	↓		休薬完了
カルボプラチン	↓				休薬完了
ベバシズマブ	↓				休薬完了

【肺非-01-A3】M CBDCA+PTX(weekly)+BEV(3 回目)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	レスタミンコーワ5錠		パクリタキセル投与 30 分前に内服終了
薬剤 2	生食 100ml+デカトロン(3.3mg)3A+ガスター 1A		10 分で点滴
薬剤 3	パロセトロン点滴用バッグ 0.75mg		30 分で点滴
薬剤 4	パクリタキセル 80mg/m ²		生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 5	カルボプラチン AUC 6		生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 6	ベバシズマブ 15mg/kg		生食 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 7	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(Day8、15)

薬剤 1	レスタミンコーワ5錠		パクリタキセル投与 30 分前に内服終了
薬剤 2	生食 100ml+デカトロン(3.3mg) 3A+ガスター 1A		30 分で点滴
薬剤 3	パクリタキセル 80mg/m ²		生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 4	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
パクリタキセル	↓	↓	↓		休薬完了
カルボプラチン	↓				休薬完了
ベバシズマブ	↓				休薬完了

【肺非-01m】M CBDCA+PTX

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	レスタミンコーワ5錠		パクリタキセル投与 30 分前に内服終了
薬剤 2	生食 100ml+デカトロン(3.3mg)4A+ガスター 1A		10 分で点滴
薬剤 3	ハロ/セロン点滴用バッグ 0.75mg		30 分で点滴
薬剤 4	パクリタキセル 200mg/m ²		生食 500ml に混注し 180 分で点滴
薬剤 5	カルボプラチン AUC 6		生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 6	生食 100ml		全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
パクリタキセル	↓			休薬完了
カルボプラチン	↓			休薬完了

【肺非-01m-A1】M CBDCA+PTX+BEV(1 回目)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	レスタミンコーワ5錠		パクリタキセル投与 30 分前に内服終了
薬剤 2	生食 100ml+デカトロン(3.3mg)4A+ガスター 1A		10 分で点滴
薬剤 3	パロセトロン点滴用バッグ 0.75mg		30 分で点滴
薬剤 4	パクリタキセル 200mg/m ²		生食 500ml に混注し 180 分で点滴
薬剤 5	カルボプラチン AUC 6		生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 6	ベバシズマブ 15mg/kg		生食 100ml に混注し 90 分で点滴
薬剤 7	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
パクリタキセル	↓			休薬完了
カルボプラチン	↓			休薬完了
ベバシズマブ	↓			休薬完了

【肺非-01m-A2】M CBDCA+PTX+BEV(2回目)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	レスタミンコーワ5錠		パクリタキセル投与 30 分前に内服終了
薬剤 2	生食 100ml+デカトロン(3.3mg)4A+ガスター 1A		10 分で点滴
薬剤 3	ハロノセロン点滴用バッグ 0.75mg		30 分で点滴
薬剤 4	パクリタキセル 200mg/m ²		生食 500ml に混注し 180 分で点滴
薬剤 5	カルボプラチン AUC 6		生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 6	ベバシズマブ 15mg/kg		生食 100ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 7	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
パクリタキセル	↓			休薬完了
カルボプラチン	↓			休薬完了
ベバシズマブ	↓			休薬完了

【肺非-01m-A3】M CBDCA+PTX+BEV(3 回目)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	レスタミンコーワ5錠		パクリタキセル投与 30 分前に内服終了
薬剤 2	生食 100ml+デカトロン(3.3mg)4A+ガスター 1A		10 分で点滴
薬剤 3	ハロノセロン点滴用バッグ 0.75mg		30 分で点滴
薬剤 4	パクリタキセル 200mg/m ²		生食 500ml に混注し 180 分で点滴
薬剤 5	カルボプラチン AUC 6		生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 6	ベバシズマブ 15mg/kg		生食 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 7	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
パクリタキセル	↓			休薬完了
カルボプラチン	↓			休薬完了
ベバシズマブ	↓			休薬完了

【肺非-02 AS1】☆ CDDP+PEM+BEV(1 回目)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	パロセトン点滴用バッグ	0.75mg+デカドン(3.3mg)3A	15 分で点滴
薬剤 2	ソルデム 3 号	500ml+硫酸 Mg 補正液 8ml	60 分で点滴
薬剤 3	ペメトレキセド	500 mg/m ²	生食 100ml に混注し 10 分で点滴
※薬剤4開始前にアプレピタントカプセル 125mg を内服			
薬剤 4	生食	500ml	60 分で点滴
薬剤 5	ラシックス	20mg1A	ワンショット静注
薬剤 6	ランダ	75mg/m ²	生食 500ml(ーランダ量)に混注し 60 分で点滴
薬剤 7	生食	500ml	60 分で点滴
薬剤 8	ベバシズマブ	15mg/kg	生食 100ml に混注し 90 分で点滴
薬剤 9	生食	100ml	(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
ペメトレキセド	↓			休薬完了
ランダ	↓			
ベバシズマブ	↓			

【肺非-02 AS2】☆ CDDP＋PEM＋BEV(2 回目)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	パロセトン点滴用バッグ	0.75mg＋デカロン(3.3mg)3A	15 分で点滴
薬剤 2	ソルデム 3 号	500ml＋硫酸 Mg 補正液 8ml	60 分で点滴
薬剤 3	ペメトレキセド	500mg/m ²	生食 100ml に混注し 10 分で点滴
※薬剤4開始前にアプレピタントカプセル 125mg を内服			
薬剤 4	生食	500ml	60 分で点滴
薬剤 5	ラシックス	20mg1A	ワンショット静注
薬剤 6	ランダ	75mg/m ²	生食 500ml(ーランダ量)に混注し 60 分で点滴
薬剤 7	生食	500ml	60 分で点滴
薬剤 8	ベバシズマブ	15mg/kg	生食 100ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 9	生食	100ml	(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
ペメトレキセド	↓			休薬完了
ランダ	↓			
ベバシズマブ	↓			

【肺非-02 AS3】☆ CDDP＋PEM＋BEV(3 回目以降)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	パロセトン点滴用バッグ	0.75mg＋デカドン(3.3mg)3A	15 分で点滴
薬剤 2	ソルデム 3 号	500ml＋硫酸 Mg 補正液 8ml	60 分で点滴
薬剤 3	ペメトレキセド	500 mg/m ²	生食 100ml に混注し 10 分で点滴
※薬剤4開始前にアプレピタントカプセル 125mg を内服			
薬剤 4	生食	500ml	60 分で点滴
薬剤 5	ラシックス	20mg1A	ワンショット静注
薬剤 6	ランダ	75mg/m ²	生食 500ml(ーランダ量)に混注し 60 分で点滴
薬剤 7	生食	500ml	60 分で点滴
薬剤 8	ベバシズマブ	15mg/kg	生食 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 9	生食	100ml	(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
ペメトレキセド	↓			休薬完了
ランダ	↓			
ベバシズマブ	↓			

【肺非-02S】☆ CDDP＋PEM

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	ハロ/セロン点滴用バッグ	0.75mg＋デカロン(3.3mg)3A	15 分で点滴
薬剤 2	ソルテム 3 号	500ml＋硫酸 Mg 補正液 8ml	60 分で点滴
薬剤 3	ペメトレキセド	500mg/m ²	生食 100ml に混注し 10 分で点滴
※薬剤4開始前にアプレピタントカプセル 125mg を内服			
薬剤 4	生食	500ml	60 分で点滴
薬剤 5	ラシックス	20mg1A	ワンショット静注
薬剤 6	ランダ	75mg/m ²	生食 500ml(ーランダ量)に混注し 60 分で点滴
薬剤 7	生食	500ml	60 分で点滴

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
ペメトレキセド	↓			休薬完了
ランダ	↓			休薬完了

【肺非-03】M CBDCA+PEM

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	ハロ/セロン点滴用バッグ	0.75mg+デカロン(3.3mg)3A	30 分で点滴
薬剤 2	ペメトレキセド	500mg/m ²	生食 100ml に混注し、10 分で点滴
薬剤 3	カルボプラチン	AUC 5	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 4	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
ペメトレキセド	↓			休薬完了
カルボプラチン	↓			休薬完了

【肺非-03 A1】M CBDCA＋PEM＋BEV(1 回目)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	ハロセトン点滴用バッグ	0.75mg＋デカドロン(3.3mg)3A	30 分で点滴
薬剤 2	ペメトレキセド	500mg/m ²	生食 100ml に混注し 10 分で点滴
薬剤 3	カルボプラチン	AUC 5	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 4	ベバシズマブ	15mg/kg	生食 100ml に混注し 90 分で点滴
薬剤 5	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
ペメトレキセド	↓			休薬完了
カルボプラチン	↓			
ベバシズマブ	↓			

【肺非-03 A2】M CBDCA＋PEM＋BEV(2 回目)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	ハロセロン点滴用バッグ	0.75mg＋デカドロン(3.3mg)3A	30 分で点滴
薬剤 2	ペメトレキセド	500mg/m ²	生食 100ml に混注し 10 分で点滴
薬剤 3	カルボプラチン	AUC 5	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 4	ベバシズマブ	15mg/kg	生食 100ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 5	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
ペメトレキセド	↓			休薬完了
カルボプラチン	↓			
ベバシズマブ	↓			

【肺非-03 A3】M CBDCA＋PEM＋BEV(3 回目)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	パロセトン点滴用バッグ	0.75mg＋デカロン(3.3mg)3A	30 分で点滴
薬剤 2	ペメトレキセド	500mg/m ²	生食 100ml に混注し 10 分で点滴
薬剤 3	カルボプラチン	AUC 5	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 4	ベバシズマブ	15mg/kg	生食 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 5	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
ペメトレキセド	↓			休薬完了
カルボプラチン	↓			
ベバシズマブ	↓			

【肺非-04S】☆CDDP＋DOC

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	パロセトン点滴用バッグ	0.75mg＋デカトン(3.3mg)3A	15 分で点滴
薬剤 2	ソルテム 3 号	500ml＋硫酸 Mg 補正液 8ml	60 分で点滴
薬剤 3	ドセタキセル	60mg/m ²	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
※薬剤4開始前にアプレピタントカプセル 125mg を内服			
薬剤 4	生食	500ml	60 分で点滴
薬剤 5	ラシックス	20mg1A	ワンショット静注
薬剤 6	ランダ	80mg/m ²	生食 500ml(ーランダ量)に混注し 60 分で点滴
薬剤 7	生食	500ml	60 分で点滴

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
ドセタキセル	↓			休薬完了
ランダ	↓			休薬完了

【肺非-05】M CBDCA+DOC

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	ハロ/セロン点滴用バッグ	0.75mg+デカロン(3.3mg)3A	30 分で点滴
薬剤 2	カルボプラチン	AUC 5	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	ドセタキセル	60mg/m ²	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 4	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
カルボプラチン	↓			休薬完了
ドセタキセル	↓			休薬完了

【肺非-06-AS1】☆ CDDP＋GEM＋BEV(1 回目)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	パロセトロン点滴用バッグ	0.75mg＋デカドロン(3.3mg)3A	15 分で点滴
薬剤 2	ソルデム 3 号	500ml＋硫酸 Mg 補正液 8ml	60 分で点滴
薬剤 3	ゲムシタビン	1000mg/m ²	5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 4	アプレピタントカプセル	125mg1Cap	ランダ点滴 1 時間前に内服
薬剤 5	生食	500ml	60 分で点滴
薬剤 6	ラシックス	20mg1A	ワンショット静注
薬剤 7	ランダ	80 mg/m ²	生食 500ml(－ランダ量)に混注し 60 分で点滴
薬剤 8	生食	500ml	60 分で点滴
薬剤 9	ベバシズマブ	15mg/kg	生食 100ml に混注し 90 分で点滴
薬剤 10	生食	100ml	(フラッシュ用)

(Day8)

薬剤 1	グラニセトロンバッグ	3mg1 袋＋デカドロン(3.3mg)1A	30 分で点滴
薬剤 2	ゲムシタビン	1000mg/m ²	5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	ルートフラッシュ用

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
ゲムシタビン	↓	↓		休薬完了
ランダ	↓			休薬完了
ベバシズマブ	↓			休薬完了

【肺非-06-AS2】☆ CDDP＋GEM＋BEV(2 回目)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	パロセトロン点滴用バッグ	0.75mg＋デカドロン(3.3mg)3A	15 分で点滴
薬剤 2	ソルデム 3 号	500ml＋硫酸 Mg 補正液 8ml	60 分で点滴
薬剤 3	ゲムシタビン	1000mg/m ²	5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 4	アプレピタントカプセル	125mg1Cap	ランダ点滴 1 時間前に内服
薬剤 5	生食	500ml	60 分で点滴
薬剤 6	ラシックス	20mg1A	ワンショット静注
薬剤 7	ランダ	80mg/m ²	生食 500ml(－ランダ量)に混注し 60 分で点滴
薬剤 8	生食	500ml	60 分で点滴
薬剤 9	ベバシズマブ	15mg/kg	生食 100ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 10	生食	100ml	(フラッシュ用)

(Day8)

薬剤 1	グラニセトロンバッグ	3mg1 袋＋デカドロン(3.3mg)1A	30 分で点滴
薬剤 2	ゲムシタビン	1000mg/m ²	5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	ルートフラッシュ用

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
ゲムシタビン	↓	↓		休薬完了
ランダ	↓			休薬完了
ベバシズマブ	↓			休薬完了

【肺非-06-AS3】☆ CDDP＋GEM＋BEV(3回目以降)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	パロセトロン点滴用バッグ	0.75mg＋デカドロン(3.3mg)3A	15分で点滴
薬剤 2	ソルデム 3号	500ml＋硫酸 Mg 補正液 8ml	60分で点滴
薬剤 3	ゲムシタビン	1000mg/m ²	5%ブドウ糖 100ml に混注し 30分で点滴
薬剤 4	アプレピタントカプセル	125mg1Cap	ランダ点滴 1時間前に内服
薬剤 5	生食	500ml	60分で点滴
薬剤 6	ラシックス	20mg1A	ワンショット静注
薬剤 7	ランダ	80mg/m ²	生食 500ml(－ランダ量)に混注し 60分で点滴
薬剤 8	生食	500ml	60分で点滴
薬剤 9	ベバシズマブ	15mg/kg	生食 100ml に混注し 30分で点滴
薬剤 10	生食	100ml	(フラッシュ用)

(Day8)

薬剤 1	グラニセトロンバッグ	3mg1 袋＋デカドロン(3.3mg)1A	30分で点滴
薬剤 2	ゲムシタビン	1000mg/m ²	5%ブドウ糖 100ml に混注し 30分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	ルートフラッシュ用

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
ゲムシタビン	↓	↓		休薬完了
ランダ	↓			休薬完了
ベバシズマブ	↓			休薬完了

【肺非-06S】☆ CDDP＋GEM

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	パロセトン点滴用バッグ	0.75mg＋デカドン(3.3mg)3A	15 分で点滴
薬剤 2	ソルデム 3 号	500ml＋硫酸 Mg 補正液 8ml	60 分で点滴
薬剤 3	ゲムシタビン	1000mg/m ²	5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
※薬剤4開始前にアプレピタントカプセル 125mg を内服			
薬剤 4	生食	500ml	60 分で点滴
薬剤 5	ラシックス	20mg1A	ワンショット静注
薬剤 6	ランダ	80mg/m ²	生食 500ml(ーランダ量)に混注し 60 分で点滴
薬剤 7	生食	500ml	60 分で点滴

(Day8)

薬剤 1	グラニセトンバッグ	3mg1 袋＋デカドン(3.3mg)1A	30 分で点滴
薬剤 2	ゲムシタビン	1000mg/m ²	5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	ルートフラッシュ用

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
ゲムシタビン	↓	↓		休薬完了
ランダ	↓			休薬完了

【肺非-07】M CBDCA＋GEM

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	パロセトロン点滴用バッグ	0.75mg＋デカトン(3.3mg)3A	30 分で点滴
薬剤 2	カルボプラチン	AUC 5	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	ゲムシタビン	1000mg/m ²	5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 4	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(Day8)

薬剤 1	生食 100ml＋デカトン(3.3mg)1A	30 分で点滴
薬剤 2	ゲムシタビン 1000mg/m ²	5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 3	生食 100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
カルボプラチン	↓			休薬完了
ゲムシタビン	↓	↓		休薬完了

【肺非-07a】M CBDCA＋GEM(Biweekly)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1、15)			
薬剤 1	パロセトロン点滴用バッグ	0.75mg＋デカドロン(3.3mg)3A	30 分で点滴
薬剤 2	カルボプラチン	AUC 2	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	ゲムシタビン	1000mg/m ²	5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 4	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21	Day28
カルボプラチン	↓		↓		休薬完了
ゲムシタビン	↓		↓		休薬完了

【肺非-08S RT】☆ CDDP+NVB+RT

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	パロセトン点滴用バッグ 0.75mg+デカトン(3.3mg)3A		15 分で点滴
薬剤 2	ソルデム 3 号 500ml+硫酸 Mg 補正液 8ml		60 分で点滴
薬剤 3	ロゼウス	20mg/m ²	生食 50ml に混注し全開で点滴
※薬剤4開始前にアプレピタントカプセル 125mg を内服			
薬剤 4	生食	500ml	60 分で点滴
薬剤 5	ラシックス	20mg1A	ワンショット静注
薬剤 6	ランダ	80mg/m ²	生食 500ml(ーランダ量)に混注し 60 分で点滴
薬剤 7	生食	500ml	60 分で点滴

(Day8)

薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用
薬剤 2	ロゼウス	20mg/m ²	生食 50ml に混注し、全開で 10 分以内
薬剤 3	ソルデム 3 号	200ml	24 分で点滴(500ml/h)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
ランダ	↓			休薬完了
ロゼウス	↓	↓		休薬完了

【肺非-08S】☆ CDDP+NVB

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	パロセトン点滴用バッグ 0.75mg+デカロン(3.3mg)3A		15 分で点滴
薬剤 2	ソルデム 3 号 500ml+硫酸 Mg 補正液 8ml		60 分で点滴
薬剤 3	ロゼウス	25mg/m ²	生食 50ml に混注し全開で点滴
※薬剤4開始前にアプレピタントカプセル 125mg を内服			
薬剤 4	生食	500ml	60 分で点滴
薬剤 5	ラシックス	20mg1A	ワンショット静注
薬剤 6	ランダ	80mg/m ²	生食 500ml(ーランダ量)に混注し 60 分で点滴
薬剤 7	生食	500ml	60 分で点滴

(Day8)

薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用
薬剤 2	ロゼウス	25mg/m ²	生食 50ml に混注し、全開で 10 分以内
薬剤 3	ソルデム 3 号	200ml	24 分で点滴(500ml/h)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
ランダ	↓			休薬完了
ロゼウス	↓	↓		休薬完了

【肺非-09S】☆ CDDP＋CPT-11

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	ハロセロン点滴用バッグ	0.75mg＋デカロン(3.3mg)3A	15 分で点滴
薬剤 2	生食	500ml＋硫酸 Mg 補正液 8ml	60 分で点滴
薬剤 3	トポテシン	60mg/m ²	生食 500ml に混注し 90 分で点滴
薬剤 4	アプレピタントカプセル	125mg1Cap	トポテシン投与開始 30 分後に内服
薬剤 5	ラシックス	20mg1A	ワンショット静注
薬剤 6	ランダ	60mg/m ²	生食に混注(計 500ml)し 60 分で点滴
薬剤 7	生食	500ml	60 分で点滴

(Day8、15)

薬剤 1	グラニセロンバッグ	3mg1 袋＋デカロン(3.3mg)1A	30 分で点滴
薬剤 2	トポテシン	60mg/m ²	5%ブドウ糖 500ml に混注し 90 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
ランダ	↓				休薬完了
トポテシン	↓	↓	↓		休薬完了

【肺非-10】M CBDCA＋CPT-11

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	ハロ/セロン点滴用バッグ	0.75mg＋デカロン(3.3mg)3A	30 分で点滴
薬剤 2	カルボプラチン	AUC 5	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	トポテシン	50mg/m ²	生食 500ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 4	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
カルボプラチン	↓			休薬完了
トポテシン	↓			休薬完了

【肺非-11】L GEM＋NVB

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1、8)			
薬剤 1	生食 100ml＋デカトロン(3.3mg)1A		30 分で点滴
薬剤 2	ロゼウス	25mg/m ²	生食 50ml に混注し、全開で 10 分以内
薬剤 3	ソルデム 3 号	200ml	30 分で点滴
薬剤 4	ゲムシタビン	1000mg/m ²	5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 5	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8		Day15	Day21
ロゼウス	↓	↓			休薬完了
ゲムシタビン	↓	↓			休薬完了

【肺非-12】L PTX(weekly)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1、8、15)			
薬剤 1	レスタミンコーワ5錠		パクリタキセル投与 30 分前に内服終了
薬剤 2	生食 100ml+デカトロン(3.3mg)3A+ガスター 1A		30 分で点滴
薬剤 3	パクリタキセル 80mg/m ²		生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 4	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
パクリタキセル	↓	↓	↓		休薬完了

【肺非-12m】L PTX

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	レスタミンコーワ5錠		パクリタキセル投与 30 分前に内服終了
薬剤 2	生食 100ml+デカトロン(3.3mg)4A+ガスター 1A		30 分で点滴
薬剤 3	パクリタキセル 200mg/m ²		生食 500ml に混注し3時間で点滴
薬剤 4	生食	100ml	30 分(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
パクリタキセル	↓			休薬完了

【肺非-13】L DOC

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食 100ml+デカトロン(3.3mg)2A		30 分で点滴
薬剤 2	ドセタキセル	60mg/m ²	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
ドセタキセル	↓			休薬完了

【肺非-13a】L DOC(分割)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1、8)			
薬剤 1	生食 100ml+デカトロン(3.3mg)2A		30 分で点滴
薬剤 2	ドセタキセル	35mg/m ²	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
ドセタキセル	↓	↓		休薬完了

【肺非-14】M CPT-11(3投1休)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1、8、15)			
薬剤 1	グラニセロンバッグ	3mg1 袋＋デカドロン(3.3mg)3A	30 分で点滴
薬剤 2	トポテシン	100mg/m ²	生食 500ml に混注し 90 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
トポテシン	↓	↓	↓		休薬完了

【肺非-14a】M CPT-11(2 投 1 休)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1、8)			
薬剤 1	グラニセロンバッグ	3mg1 袋＋デカドロン(3.3mg)3A	30 分で点滴
薬剤 2	トポテシン	100mg/m ²	生食 500ml に混注し 90 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
トポテシン	↓	↓		休薬完了

【肺非-15】L GEM(3投1休)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1、8、15)			
薬剤 1	生食 100ml+デカトロン(3.3mg)1A		30 分で点滴
薬剤 2	ゲムシタビン	1000mg/m ²	5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
ゲムシタビン	↓	↓	↓		休薬完了

【肺非-15a】L GEM(2投1休)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1、8)			
薬剤 1	生食 100ml+デカトロン(3.3mg)1A		30 分で点滴
薬剤 2	ゲムシタビン	1000mg/m ²	5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
ゲムシタビン	↓	↓		休薬完了

【肺非-15b】L GEM(隔週)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食 100ml+デカトロン(3.3mg)1A		30 分で点滴
薬剤 2	ゲムシタビン	1000mg/m ²	5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21	Day28
ゲムシタビン	↓		↓		休薬完了

【肺非-16】NVB（毎週）

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1、8、15)			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用
薬剤 2	ロゼウス	25mg/m ²	生食 50ml に混注し、全開で 10 分以内
薬剤 3	ソルデム 3 号	200ml	30 分で点滴

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
ロゼウス	↓	↓	↓	休薬完了

【肺非-16a】NVB(3投1休)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1、8、15)			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用
薬剤 2	ロゼウス	25 mg/m ²	生食 50ml に混注し、全開で 10 分以内
薬剤 3	ソルデム 3 号	200ml	30 分で点滴

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
ロゼウス	↓	↓	↓		休薬完了

【肺非-16b】NVB(2投1休)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1、8)			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用
薬剤 2	ロゼウス	25mg/m ²	生食 50ml に混注し、全開で 10 分以内
薬剤 3	ソルデム 3 号	200ml	30 分で点滴

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
ロゼウス	↓	↓		休薬完了

【肺非-16c】NVB（隔週）

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1、15）			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用
薬剤 2	ロゼウス	25 mg/m ²	生食 50ml に混注し、全開で 10 分以内
薬剤 3	ソルデム 3 号	200ml	30 分で点滴

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
ロゼウス	↓		↓		休薬完了

【肺非-17】L PEM

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食 100ml+デカトロン(3.3mg)2A		30 分で点滴
薬剤 2	ペメトレキセド	500mg/m ²	生食 100ml に混注し 10 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
ペメトレキセド	↓			休薬完了

【肺非-17 A1】L PEM+BEV(1回目)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食 100ml+デカロン(3.3mg)2A		30 分で点滴
薬剤 2	ペメトレキセド	500mg/m ²	生食 100ml に混注し 10 分で点滴
薬剤 3	ベバシズマブ	15mg/kg	生食 100ml に混注し 90 分で点滴
薬剤 4	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
ペメトレキセド	↓			休薬完了
ベバシズマブ	↓			

【肺非-17 A2】L PEM＋BEV(2回目)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食 100ml＋デカロン(3.3mg)2A		30 分で点滴
薬剤 2	ペメトレキセド	500mg/m ²	生食 100ml に混注し、10 分で点滴
薬剤 3	ベバシズマブ	15mg/kg	生食 100ml に混注し、60 分で点滴
薬剤 4	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
ペメトレキセド	↓			休薬完了
ベバシズマブ	↓			

【肺非-17 A3】L PEM＋BEV

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食 100ml＋デカロン(3.3mg)2A		30 分で点滴
薬剤 2	ペメトレキセド	500 mg/m ²	生食 100ml に混注し、10 分で点滴
薬剤 3	ベバシズマブ	15mg/kg	生食 100ml に混注し、30 分で点滴
薬剤 4	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
ペメトレキセド	↓			休薬完了
ベバシズマブ	↓			

【肺非-18】M AMR

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1、2、3)			
薬剤 1	グラニセロンバッグ	3mg1 袋＋デカドロン 3.3mg × 2A	30 分で点滴
薬剤 2	カルセド	45mg/m ²	生食 50m に混注し、全開で 10 分以内
薬剤 3	生食	100ml	(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day2	Day3	Day4	...	Day21
カルセド	↓	↓	↓			休薬完了

【肺非-19】BEV

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	ベバシズマブ	15mg/kg	30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	30 分で点滴(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
ベバシズマブ	↓			休薬完了

【肺非-20】M CBDCA+S-1

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	パロセトロン点滴用バッグ 0.75mg+デカドロン(3.3mg)3A		30 分で点滴
薬剤 2	カルボプラチン AUC 5		生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	ルートフラッシュ用
(Day1-14)			
薬剤 1	エスワン	40mg/m ² /回	1回量を朝夕食後に内服

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
カルボプラチン	↓			休薬完了
エスワン	Day1 より2週内服 1 週休薬 1 回 40mg/m ² を 1 日 2 回朝夕食後に内服			

【肺非-21S】☆ S-1+CDDP・外来用

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

薬剤名	投与量	投与方法
(Day1-21)		
薬剤 1 エスワン		下記 特記事項を参照 2×朝夕食後内服

(Day8)

薬剤 1	アフレピタントカプセル 125mg1Cap	薬剤 2 点滴開始前に内服
薬剤 2	ソルデム 3 号 500ml+硫酸 Mg 補正液 8ml	60 分で点滴
薬剤 3	生食 100ml+パロノセロンハッグ 0.75mg+デカトロン(3.3mg)3A	15 分で点滴
薬剤 4	ラシックス 20mg1A	ワンショット静注
薬剤 5	ランダ 60mg/m ²	生食に混注(計 500ml)し 90 分で点滴
薬剤 6	ソルアセト F 500ml	60 分で点滴
薬剤 7	ソルデム 3 号 500ml	60 分で点滴

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day29	Day35
ランダ		↓				休薬完了
エスワン	Day1 より3週内服2週休薬 指定量を 1 日 2 回朝夕食後に内服					休薬完了

(特記事項(使用上の注意など))

【エスワン投与量】

体表面積	1.25m ² 未満	→ 80mg/day
	1.25m ² 以上 1.5m ²	→100mg/day
	1.50m ² 以上	→120mg/day

【肺非-22】M CBDCA＋nabPTX

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	パロセトロン点滴用バッグ	0.75mg＋デカトン(3.3mg)3A	30 分で点滴
薬剤 2	アブラキサン	100mg/m ²	30 分で点滴(生食に溶解し、ラベルに全量を記載)
薬剤 3	カルボプラチン	AUC 6	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 4	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(Day8、15)

薬剤 1	生食 100ml＋デカトン(3.3mg)1A	30 分で点滴
薬剤 2	アブラキサン 100mg/㎡	30 分で点滴(生食に溶解し、ラベルに投与量を記載)
薬剤 3	生食 100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
アブラキサン	↓	↓	↓	休薬完了
カルボプラチン	↓			休薬完了

【肺非-23】L nabPTX

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1、8、15)			
薬剤 1	生食 100ml+デカトロン(3.3mg)1A		30 分で点滴
薬剤 2	アブラキサン	100mg/m ²	30 分で点滴(生食に溶解し、ラベルに全量を記載)
薬剤 3	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
アブラキサン	↓	↓	↓	休薬完了

【肺非-24A1】BEV＋Erlotinib（1 回目）

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	ベバシズマブ	15mg/kg	1 時間 30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	10 分で点滴（フラッシュ用）

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
ベバシズマブ	↓			休薬完了
タルセバ錠	1 日 1 回 150mg を朝食 2 時間後に内服			

【肺非-24A2】BEV＋Erlotinib（2 回目）

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	ベバシズマブ	15mg/kg	1 時間で点滴
薬剤 3	生食	100ml	10 分で点滴（フラッシュ用）

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
ベバシズマブ	↓			休薬完了
タルセバ錠	1 日 1 回 150mg を朝食 2 時間後に内服			

【肺非-24A3】BEV＋Erlotinib(3 回目)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	ベバシズマブ	15mg/kg	30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	10 分で点滴(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
ベバシズマブ	↓			休薬完了
タルセバ錠	1 日 1 回 150mg を朝食 2 時間後に内服			

【肺非-25-1】 Nivolumab240(初回検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	オブジーボ	240mg/body	生食 100ml(全量 100ml に調製)に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	10 分で点滴(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day14
オブジーボ	↓		休薬完了

【肺非-25-2】 Nivolumab240(2 回目以降検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	オブジーボ	240mg/body	生食 100ml(全量 100ml に調製)に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	10 分で点滴(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day14
オブジーボ	↓		休薬完了

【肺非-25-3】 オプジーボ 480(4 週毎:初回検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	オプジーボ	480mg/body	生食 100ml(全量 100ml に調製)に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	10 分で点滴(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	...	Day28
オプジーボ	↓		...	休薬完了

【肺非-25-4】 オプジーボ 480(4 週毎:2 回目以降検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)	※輸液セットはシュアプラグ輸液セットを使用		
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	オプジーボ	480mg/body	生食 100ml(全量 100ml に調製)に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	10 分で点滴(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	...	Day28
オプジーボ	↓		...	休薬完了

【肺非-25-5】 オプジーボ 360(3 週毎:2 回目以降検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	オプジーボ	360mg/body	生食 100ml(全量 100ml に調製)に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	10 分で点滴(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	...	Day21
オプジーボ	↓		...	休薬完了

【肺非-26】L DOC+RAM

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	フェキソフェナジン塩酸塩 OD錠 60mg1錠		点滴開始前に内服
薬剤 2	生食 100ml+デカトロン(3.3mg)2A+ガスター 1A		30分で点滴
薬剤 3	サイラムザ 10mg/kg		生食 250ml(全量 250ml に調製)に混注し 60分で点滴
※忍容性が良好であれば2回目以降は30分まで短縮可			
薬剤 4	生食 50ml		ルートフラッシュ用
薬剤 5	ドセタキセル 60mg/m ²		生食 250ml に混注し 60分で点滴
薬剤 6	生食 50ml		ルートフラッシュ用

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
サイラムザ	↓			休薬完了
ドセタキセル	↓			休薬完了

【肺非-27-1】 Pembrolizumab(初回検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	キイトルーダ	200mg/body	生食 50ml に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
キイトルーダ	↓			休薬完了

【肺非-27-2】 Pembrolizumab(2 回目以降検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	キイトルーダ	200mg/body	生食 50ml に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
キイトルーダ	↓			休薬完了

【肺非-27-3】キイトルーダ(6 週毎:2 回目以降検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	キイトルーダ	400mg/body	生食 50ml に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	...	Day42
キイトルーダ	↓				休薬完了

【肺非-28-1】 Atezolizumab（初回検査付）

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	テセントリク	1200mg/body	生食 250ml に混注し、60 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	（フラッシュ用）

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
テセントリク	↓			休薬完了

【肺非-28-2】 Atezolizumab (2 回目以降検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	テセントリク	1200mg/body	生食 250ml に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
テセントリク	↓			休薬完了

【肺非-30S1】☆CDDP＋PEM＋キイトルーダ[®](初回検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	パロセトロン点滴用バッグ	0.75mg＋デカトロン(3.3mg)3A	15 分で点滴
薬剤 2	ソルデム 3 号	500ml＋硫酸 Mg 補正液 8ml	60 分で点滴
薬剤 3	キイトルーダ [®]	200mg/body	生食 50ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 4	ペメトレキセド	500 mg/m ²	生食 100ml に混注し 10 分で点滴
※薬剤 5 開始前にアプレピタントカプセル 125mg を内服			
薬剤 5	生食	500ml	60 分で点滴
薬剤 6	ラシックス	20mg1A	ワンショット静注
薬剤 7	ランダ [®]	75mg/m ²	生食 500ml(ーランダ [®] 量)に混注し 60 分で点滴
薬剤 8	生食	500ml	60 分で点滴

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
キイトルーダ [®]	↓			休薬完了
ペメトレキセド	↓			休薬完了
ランダ [®]	↓			休薬完了

【肺非-30S2】☆CDDP＋PEM＋キイトルーダ(2回目以降検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	パロセロン点滴用バッグ	0.75mg＋デカトン(3.3mg)3A	15分で点滴
薬剤 2	ソルテム 3号	500ml＋硫酸 Mg 補正液 8ml	60分で点滴
薬剤 3	キイトルーダ	200mg/body	生食 50ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 4	ペメトレキセド	500mg/m ²	生食 100ml に混注し 10 分で点滴
※薬剤 5 開始前にアプレピタントカプセル 125mg を内服			
薬剤 5	生食	500ml	60 分で点滴
薬剤 6	ラシックス	20mg1A	ワンショット静注
薬剤 7	ランダ	75mg/m ²	生食 500ml(ーランダ量)に混注し 60 分で点滴
薬剤 8	生食	500ml	60 分で点滴

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
キイトルーダ	↓			休薬完了
ペメトレキセド	↓			休薬完了
ランダ	↓			休薬完了

【肺非-31】L PEM＋キイトルーダ(検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食 100ml＋デカトロン(3.3mg)2A	30 分で点滴	
薬剤 2	キイトルーダ	200mg/body	生食 50ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 3	ペメトレキセド	500 mg/m ²	生食 100ml に混注し 10 分で点滴
薬剤 4	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
キイトルーダ	↓			休薬完了
ペメトレキセド	↓			休薬完了

【肺非-32-1】M CBDCA+PEM+キイトルーダ(初回検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	ハロ/セロン点滴用バッグ	0.75mg+デカドロン(3.3mg)3A	30 分で点滴
薬剤 2	キイトルーダ	200mg/body	生食 50ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 3	ペメトレキセド	500mg/m ²	生食 100ml に混注し 10 分で点滴
薬剤 4	カルボプラチン	AUC 5	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 5	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
キイトルーダ	↓			休薬完了
ペメトレキセド	↓			休薬完了
カルボプラチン	↓			休薬完了

【肺非-32-2】M CBDCA＋PEM＋キイトルーダ(2回目以降検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	パロセトン点滴用バッグ	0.75mg＋デカドン(3.3mg)3A	30分で点滴
薬剤 2	キイトルーダ	200mg/body	生食 50ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 3	ペメトレキセド	500mg/m ²	生食 100ml に混注し 10 分で点滴
薬剤 4	カルボプラチン	AUC 5	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 5	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
キイトルーダ	↓			休薬完了
ペメトレキセド	↓			休薬完了
カルボプラチン	↓			休薬完了

【肺非-33-1】M CBDCA+PTX+キイトルーダ(初回検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食 100ml+デカトロン(3.3mg)4A+ガスター 1A		10 分で点滴
薬剤 2	パロセトロン点滴用バッグ 0.75mg		15 分で点滴
※薬剤 3 開始前にレスタミンコーワ5錠を内服			
薬剤 3	キイトルーダ	200mg/body	生食 50ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 4	生食	50ml	10 分で点滴(フラッシュ用)
薬剤 5	パクリタキセル	200mg/m ²	生食 500ml に混注し 180 分で点滴
薬剤 6	カルボプラチン	AUC 6	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 7	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
キイトルーダ	↓			休薬完了
パクリタキセル	↓			休薬完了
カルボプラチン	↓			休薬完了

【肺非-33-2】M CBDCA+PTX+キイトルーダ(2回目以降検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)		
薬剤 1	生食 100ml+デカドロン(3.3mg)4A+ガスター 1A	10 分で点滴
薬剤 2	パロセトロン点滴用バッグ 0.75mg	15 分で点滴
※薬剤 3 開始前にレスタミンコーワ5錠を内服		
薬剤 3	キイトルーダ 200mg/body	生食 50ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 4	生食 50ml	10 分で点滴(フラッシュ用)
薬剤 5	パクリタキセル 200mg/m ²	生食 500ml に混注し 180 分で点滴
薬剤 6	カルボプラチン AUC 6	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 7	生食 100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
キイトルーダ	↓			休薬完了
パクリタキセル	↓			休薬完了
カルボプラチン	↓			休薬完了

【肺非-34-1】M CBDCA+PTX+BEV+テセントリク

(検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用(ルート確保後、廃棄)
薬剤 2	テセントリク	1200mg/body	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食	50ml	10 分で点滴(フラッシュ用)
薬剤 4	ベバシズマブ	15mg/kg	生食 100ml に混注し 90 分で点滴
※薬剤 5 開始前にレスタミンコーワ錠5錠を内服			
薬剤 5	生食 100ml+デカトロン(3.3mg)4A+カスター 1A		10 分で点滴
薬剤 6	パロセトロン点滴用バッグ 0.75mg		30 分で点滴
薬剤 7	パクリタキセル 200mg/m ²		生食 500ml に混注し 180 分で点滴
薬剤 8	カルボプラチン AUC 6		生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 9	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
テセントリク	↓			休薬完了
ベバシズマブ	↓			休薬完了
パクリタキセル	↓			休薬完了
カルボプラチン	↓			休薬完了

【肺非-34-2】M CBDCA+PTX+BEV+テセントリク

(検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用(ルート確保後、廃棄)
薬剤 2	テセントリク	1200mg/body	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 3	生食	50ml	10 分で点滴(フラッシュ用)
薬剤 4	ベバシズマブ	15mg/kg	生食 100ml に混注し 60 分で点滴
※薬剤 5 開始前にレスタミンコーワ錠5錠を内服			
薬剤 5	生食 100ml+デカトロン(3.3mg)4A+ガスター 1A		10 分で点滴
薬剤 6	パロセトロン点滴用バッグ 0.75mg		30 分で点滴
薬剤 7	パクリタキセル 200mg/m ²		生食 500ml に混注し 180 分で点滴
薬剤 8	カルボプラチン AUC 6		生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 9	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
テセントリク	↓			休薬完了
ベバシズマブ	↓			休薬完了
パクリタキセル	↓			休薬完了
カルボプラチン	↓			休薬完了

【肺非-34-3】M CBDCA+PTX+BEV+テセントリク(検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用(ルート確保後、廃棄)
薬剤 2	テセントリク	1200mg/body	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 3	生食	50ml	10 分で点滴(フラッシュ用)
薬剤 4	ベバシズマブ	15mg/kg	生食 100ml に混注し 30 分で点滴
※薬剤 5 開始前にレスタミンコーワ錠5錠を内服			
薬剤 5	生食 100ml+デカトロン(3.3mg)4A+カスター 1A		10 分で点滴
薬剤 6	パロセトロン点滴用バッグ 0.75mg		30 分で点滴
薬剤 7	パクリタキセル 200mg/m ²		生食 500ml に混注し 180 分で点滴
薬剤 8	カルボプラチン AUC 6		生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 9	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
テセントリク	↓			休薬完了
ベバシズマブ	↓			休薬完了
パクリタキセル	↓			休薬完了
カルボプラチン	↓			休薬完了

【肺非-35】 BEV+テセントリク(検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	テセントリク	1200mg/body	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 3	生食	50ml	10 分で点滴(フラッシュ用)
薬剤 4	ベバシズマブ	15mg/kg	生食 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 5	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
テセントリク	↓			休薬完了
ベバシズマブ	↓			休薬完了

【肺非-36-1】M CBDCA＋nabP＋キイトルーダ[®](初回検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	ハロ/セロン点滴用バッグ	0.75mg＋デカドロン(3.3mg)3A	30 分で点滴
薬剤 2	キイトルーダ	200mg/body	生食 50ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	全開(フラッシュ用)
薬剤 4	【側管】生食	100ml	ルート確保用
薬剤 5	【側管】アブラキサン		
		100mg/m ²	30 分で点滴(生食に溶解し、ラベルに全量を記載)
薬剤 6	【側管】カルボプラチン		
		AUC 6	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 7	【側管】生食	100ml	全開(フラッシュ用)
(Day8、15)			
薬剤 1	生食 100ml＋デカドロン(3.3mg)1A		30 分で点滴
薬剤 2	アブラキサン	100mg/m ²	30 分で点滴(生食に溶解し、ラベルに全量を記載)
薬剤 3	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
キイトルーダ	↓			休薬完了
アブラキサン	↓	↓	↓	休薬完了
カルボプラチン	↓			休薬完了

【肺非-36-2】M CBDCA＋nabP＋キイトルーダ

(2 回以降検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	ハロ/セロン点滴用バッグ	0.75mg＋デカトン(3.3mg)3A	30 分で点滴
薬剤 2	キイトルーダ	200mg/body	生食 50ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	全開(フラッシュ用)
薬剤 4	【側管】生食	100ml	ルート確保用
薬剤 5	【側管】アブラキサン	100mg/m ²	30 分で点滴(生食に溶解し、ラベルに全量を記載)
薬剤 6	【側管】カルボプラチン	AUC 6	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 7	【側管】生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(Day8、15)

薬剤 1	生食 100ml＋デカトン(3.3mg)1A	30 分で点滴
薬剤 2	アブラキサン 100mg/m ²	30 分で点滴(生食に溶解し、ラベルに全量を記載)
薬剤 3	生食 100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
キイトルーダ	↓			休薬完了
アブラキサン	↓	↓	↓	休薬完了
カルボプラチン	↓			休薬完了

【肺非-38-1】M CBDCA＋nabP＋テセントリク(初回検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	テセントリク	1200mg/body	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食	50ml	10 分で点滴(フラッシュ用)
薬剤 4	【側管】パロセトロン点滴用バッグ 0.75mg＋デカトロン(3.3mg)3A		30 分で点滴
薬剤 5	【側管】アブラキサン 100mg/m ²		30 分で点滴(生食に溶解し、ラベルに全量を記載)
薬剤 6	【側管】カルボプラチン AUC 6		生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 7	【側管】生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(Day8、15)

薬剤 1	生食 100ml＋デカトロン(3.3mg)1A	30 分で点滴
薬剤 2	アブラキサン 100mg/m ²	30 分で点滴(生食に溶解し、ラベルに全量を記載)
薬剤 3	生食 100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
テセントリク	↓			休薬完了
アブラキサン	↓	↓	↓	休薬完了
カルボプラチン	↓			休薬完了

【肺非-38-2】M CBDCA＋nabP＋テセントリク(2回以降検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	テセントリク	1200mg/body	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 3	生食	50ml	全開で点滴(フラッシュ用)
薬剤 4	【側管】パロセトロン点滴用バッグ 0.75mg＋デカトロン(3.3mg)3A		30 分で点滴
薬剤 5	【側管】アブラキサン 100mg/m ²		30 分で点滴(生食に溶解し、ラベルに全量を記載)
薬剤 6	【側管】カルボプラチン AUC 6		生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 7	【側管】生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(Day8、15)

薬剤 1	生食 100ml＋デカトロン(3.3mg)1A	30 分で点滴
薬剤 2	アブラキサン 100mg/m ²	30 分で点滴(生食に溶解し、ラベルに全量を記載)
薬剤 3	生食 100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
テセントリク	↓			休薬完了
アブラキサン	↓	↓	↓	休薬完了
カルボプラチン	↓			休薬完了

【肺非-39S1】☆CDDP＋PEM＋テセントリク(初回検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用
薬剤 2	テセントリク	1200mg/body	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	パロ/セロン点滴用バッグ 0.75mg＋デカロン(3.3mg)3A		
			15 分で点滴
薬剤 4	ソルデム 3 号	500ml＋硫酸 Mg 補正液 8ml	60 分で点滴
薬剤 5	ペメトレキセド	500mg/m ²	生食 100ml に混注し 10 分で点滴
※薬剤 6 開始前にアプレピタントカプセル 125mg を内服			
薬剤 6	生食	500ml	60 分で点滴
薬剤 7	ラシックス	20mg1A	ワンショット静注
薬剤 8	ランダ	75mg/m ²	生食 500ml(ーランダ量)に混注し 60 分で点滴
薬剤 9	生食	500ml	60 分で点滴

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
テセントリク	↓			休薬完了
ペメトレキセド	↓			休薬完了
ランダ	↓			休薬完了

【肺非-39S2】☆CDDP＋PEM＋テセントリク(2回目以降検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用
薬剤 2	テセントリク	1200mg/body	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 3	パロ/セロン点滴用バッグ 0.75mg＋デカロン(3.3mg)3A		
			15 分で点滴
薬剤 4	ソルテム 3 号	500ml＋硫酸 Mg 補正液 8ml	60 分で点滴
薬剤 5	ペメトレキセド	500mg/m ²	生食 100ml に混注し 10 分で点滴
※薬剤 6 開始前にアプレピタントカプセル 125mg を内服			
薬剤 6	生食	500ml	60 分で点滴
薬剤 7	ラシックス	20mg1A	ワンショット静注
薬剤 8	ランダ	75mg/m ²	生食 500ml(ーランダ量)に混注し 60 分で点滴
薬剤 9	生食	500ml	60 分で点滴

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
テセントリク	↓			休薬完了
ペメトレキセド	↓			休薬完了
ランダ	↓			休薬完了

【肺非-40-1】M CBDCA+PEM+テセントリク(初回検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	テセントリク	1200mg/body	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	パロセトロン点滴用バッグ 0.75mg+デカドロン(3.3mg)3A		30 分で点滴
薬剤 4	ペメトレキセド	500mg/m ²	生食 100ml に混注し 10 分で点滴
薬剤 5	カルボプラチン	AUC 6	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 6	生食	100ml	(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
テセントリク	↓			休薬完了
ペメトレキセド	↓			休薬完了
カルボプラチン	↓			休薬完了

【肺非-40-2】M CBDCA+PEM+テセントリク

(2回目以降検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	テセントリク	1200mg/body	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 3	パロセトロン点滴用バッグ 0.75mg+デカドロン(3.3mg)3A		30 分で点滴
薬剤 4	ペメトレキセド	500mg/m ²	生食 100ml に混注し 10 分で点滴
薬剤 5	カルボプラチン	AUC 6	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 6	生食	100ml	(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
テセントリク	↓			休薬完了
ペメトレキセド	↓			休薬完了
カルボプラチン	↓			休薬完了

【肺非-41】L PEM+テセントリク(検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	テセントリク	1200mg/body	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 3	生食 100ml+デカトロン(3.3mg)2A		30 分で点滴
薬剤 4	ペメトレキシド	500mg/m ²	生食 100ml に混注し 10 分で点滴
薬剤 5	生食	100ml	(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
テセントリク	↓			休薬完了
ペメトレキシド	↓			休薬完了

【肺非-42S】☆ CDDP＋GEM＋ポートラーザ

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用
薬剤 2	ポートラーザ	800mg/body	生食 200ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食	50ml	フラッシュ用
薬剤 4	パロセトン点滴用バッグ 0.75mg＋デカトン(3.3mg)3A		15 分で点滴
薬剤 5	ソルデム 3 号 500ml＋硫酸 Mg 補正液 8ml		60 分で点滴
薬剤 6	ゲムシタビン	1250mg/m ²	5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
※薬剤 7 開始前にアプレピタントカプセル 125mg を内服			
薬剤 7	生食	500ml	60 分で点滴
薬剤 8	ラシックス	20mg1A	ワンショット静注
薬剤 9	ランダ	75mg/m ²	生食 500ml(ーランダ量)に混注し 60 分で点滴
薬剤 10	生食	500ml	60 分で点滴

(Day8)

薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	ポートラーザ	800mg/body	生食 200ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食	50ml	フラッシュ用
薬剤 4	生食 100ml＋デカトン(3.3mg)1A		30 分で点滴
薬剤 5	ゲムシタビン	1250mg/m ²	5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 6	生食	100ml	ルートフラッシュ用

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
ポートラーザ	↓	↓		休薬完了
ゲムシタビン	↓	↓		休薬完了
ランダ	↓			休薬完了

【肺非-43】ポートルーザ

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1、8)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	ポートルーザ	800mg/body	生食 200ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	ルートフラッシュ用

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
ポートルーザ	↓	↓		休薬完了

【肺非-44S1】☆ CDDP＋GEM＋オプジーボ(初回検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用
薬剤 2	オプジーボ	360mg/body	生食 100ml(全量 100ml に調製)に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	50ml	10 分間はオプジーボと同速度、その後は全開
薬剤 4	パロセトロン点滴用バッグ 0.75mg＋デカロン(3.3mg)3A		
			15 分で点滴
薬剤 5	ソルデム 3 号 500ml＋硫酸 Mg 補正液 8ml		
			60 分で点滴
薬剤 6	ゲムシタビン	1000mg/m ²	5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
※薬剤 7 開始前にアプレピタントカプセル 125mg を内服			
薬剤 7	生食	500ml	60 分で点滴
薬剤 8	ラシックス	20mg1A	ワンショット静注
薬剤 9	ランダ	75mg/m ²	生食 500ml(ーランダ量)に混注し 60 分で点滴
薬剤 10	生食	500ml	60 分で点滴

(Day8)

薬剤 1	生食 100ml＋デカロン(3.3mg)1A	30 分で点滴
薬剤 2	ゲムシタビン	1000mg/m ² 5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml ルートフラッシュ用

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
オプジーボ	↓			休薬完了
ゲムシタビン	↓	↓		休薬完了
ランダ	↓			休薬完了

【肺非-44S2】☆ CDDP＋GEM＋オブジーボ

(2 回目以降検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用
薬剤 2	オブジーボ	360mg/body	生食 100ml(全量 100ml に調製)に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	50ml	フラッシュ用
薬剤 4	パロセトン点滴用バッグ 0.75mg＋デカトン(3.3mg)3A		
			15 分で点滴
薬剤 5	ソルデム 3 号 500ml＋硫酸 Mg 補正液 8ml		
			60 分で点滴
薬剤 6	ゲムシタビン	1000mg/m ²	5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
※薬剤 7 開始前にアプレピタントカプセル 125mg を内服			
薬剤 7	生食	500ml	60 分で点滴
薬剤 8	ラシックス	20mg1A	ワンショット静注
薬剤 9	ランダ	75mg/m ²	生食 500ml(ーランダ量)に混注し 60 分で点滴
薬剤 10	生食	500ml	60 分で点滴

(Day8)

薬剤 1	生食 100ml＋デカトン(3.3mg)1A	30 分で点滴
薬剤 2	ゲムシタビン	1000 mg/m ² 5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml ルートフラッシュ用

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
オブジーボ	↓			休薬完了
ゲムシタビン	↓	↓		休薬完了
ランダ	↓			休薬完了

【肺非-45-1】M CBDCA＋GEM＋オブジーボ(初回検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	オブジーボ	360mg/body	生食 100ml(全量 100ml に調製)に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	50ml	10 分間はオブジーボと同速度、その後は全開
薬剤 4	パロセトロン点滴用バッグ 0.75mg＋デカドロン(3.3mg)3A		
			30 分で点滴
薬剤 5	カルボプラチン	AUC 5	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 6	ゲムシタビン	1000mg/m ²	5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 7	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(Day8)

薬剤 1	生食 100ml＋デカドロン(3.3mg)1A	30 分で点滴
薬剤 2	ゲムシタビン	1000mg/m ² 5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml 全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
オブジーボ	↓			休薬完了
カルボプラチン	↓			休薬完了
ゲムシタビン	↓	↓		休薬完了

【肺非-45-2】M CBDCA＋GEM＋オブジーボ

(2 回目以降検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	オブジーボ	360mg/body	生食 100ml(全量 100ml に調製)に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	50ml	フラッシュ用
薬剤 4	パロセトロン点滴用バッグ 0.75mg＋デカトロン(3.3mg)3A		
			30 分で点滴
薬剤 5	カルボプラチン	AUC 5	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 6	ゲムシタビン	1000mg/m ²	5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 7	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(Day8)

薬剤 1	生食 100ml＋デカトロン(3.3mg)1A	30 分で点滴
薬剤 2	ゲムシタビン	1000mg/m ² 5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml 全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
オブジーボ	↓			休薬完了
カルボプラチン	↓			休薬完了
ゲムシタビン	↓	↓		休薬完了

【肺非-46S1】☆ CDDP+PEM+オブジーボ(初回検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用
薬剤 2	オブジーボ	360mg/body	生食 100ml(全量 100ml に調製)に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	50ml	10 分間はオブジーボと同速度、その後は全開
薬剤 4	パロセトロン点滴用バッグ 0.75mg+デカロン(3.3mg)3A		
			15 分で点滴
薬剤 5	ソルデム 3 号 500ml+硫酸 Mg 補正液 8ml		
			60 分で点滴
薬剤 6	ペメトレキセド	500mg/m ²	生食 100ml に混注し 10 分で点滴
※薬剤 7 開始前にアプレピタントカプセル 125mg を内服			
薬剤 7	生食	500ml	60 分で点滴
薬剤 8	ラシックス	20mg1A	ワンショット静注
薬剤 9	ランダ	75mg/m ²	生食 500ml(ーランダ量)に混注し 60 分で点滴
薬剤 10	生食	500ml	60 分で点滴

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
オブジーボ	↓			休薬完了
ペメトレキセド	↓			休薬完了
ランダ	↓			休薬完了

【肺非-46S2】☆ CDDP＋PEM＋オブジーボ

(2 回目以降検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用
薬剤 2	オブジーボ	360mg/body	生食 100ml(全量 100ml に調製)に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	50ml	フラッシュ用
薬剤 4	パロセトロン点滴用バッグ 0.75mg＋デカロン(3.3mg)3A		
			15 分で点滴
薬剤 5	ソルデム 3 号 500ml＋硫酸 Mg 補正液 8ml		
			60 分で点滴
薬剤 6	ペメトレキセド	500mg/m ²	生食 100ml に混注し 10 分で点滴
※薬剤 7 開始前にアプレピタントカプセル 125mg を内服			
薬剤 7	生食	500ml	60 分で点滴
薬剤 8	ラシックス	20mg1A	ワンショット静注
薬剤 9	ランダ	75mg/m ²	生食 500ml(ーランダ量)に混注し 60 分で点滴
薬剤 10	生食	500ml	60 分で点滴

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
オブジーボ	↓			休薬完了
ペメトレキセド	↓			休薬完了
ランダ	↓			休薬完了

【肺非-47-1】M CBDCA+PEM+オブジーボ(初回検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	オブジーボ	360mg/body	生食 100ml(全量 100ml に調製)に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	50ml	10 分間はオブジーボと同速度、その後は全開
薬剤 4	パロセトン点滴用バッグ 0.75mg+デカロン(3.3mg)3A		
			30 分で点滴
薬剤 5	ペメトレキセド	500mg/m ²	生食 100ml に混注し、10 分で点滴
薬剤 6	カルボプラチン	AUC 5	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 7	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
オブジーボ	↓			休薬完了
ペメトレキセド	↓			休薬完了
カルボプラチン	↓			休薬完了

【肺非-47-2】M CBDCA+PEM+オブジーボ

(2 回目以降検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	オブジーボ	360mg/body	生食 100ml(全量 100ml に調製)に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	50ml	フラッシュ用
薬剤 4	パロセトン点滴用バッグ 0.75mg+デカドロン(3.3mg)3A		30 分で点滴
薬剤 5	ペメトレキセド	500mg/m ²	生食 100ml に混注し、10 分で点滴
薬剤 6	カルボプラチン	AUC 5	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 7	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
オブジーボ	↓			休薬完了
ペメトレキセド	↓			休薬完了
カルボプラチン	↓			休薬完了

【肺非-48】L PEM+オブジーボ(2 回目以降検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	オブジーボ	360mg/body	生食 100ml(全量 100ml に調製)に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	50ml	フラッシュ用
薬剤 4	生食 100ml+デカトロン(3.3mg)2A		30 分で点滴
薬剤 5	ペメトレキセド	500mg/m ²	生食 100ml に混注し 10 分で点滴
薬剤 6	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
オブジーボ	↓			休薬完了
ペメトレキセド	↓			休薬完了

【肺非-49-1】 オプジーボ＋ヤーボイ(初回検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	オプジーボ	360mg/body	生食 100ml(全量 100ml に調製)に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	30 分でフラッシュ
薬剤 4	ヤーボイ	1mg/kg	生食 100ml(全量 25ml に調製)に混注し、30 分で点滴
薬剤 5	生食	100ml	20 分間はヤーボイと同速度、その後は全開

(Day22)

薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	オプジーボ	360mg/body	生食 100ml(全量 100ml に調製)に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	10 分で点滴(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	...	Day22	Day29	...	Day42
オプジーボ	↓		...	↓		...	休薬完了
ヤーボイ	↓		...			...	休薬完了

【肺非-49-2】 オプジーボ＋ヤーボイ(2 回目以降検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	オプジーボ	360mg/body	生食 100ml(全量 100ml に調製)に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	30 分でフラッシュ
薬剤 4	ヤーボイ	1mg/kg	生食 100ml(全量 25ml に調製)に混注し、30 分で点滴
薬剤 5	生食	100ml	20 分間はヤーボイと同速度、その後は全開

(Day22)

薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	オプジーボ	360mg/body	生食 100ml(全量 100ml に調製)に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	10 分で点滴(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	...	Day22	Day29	...	Day42
オプジーボ	↓		...	↓		...	休薬完了
ヤーボイ	↓		...			...	休薬完了

【肺非-50】M CBDCA+PTX+オブジーボ+ヤーボイ(検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用
薬剤 2	オブジーボ	360mg/body	生食 100ml(全量 100ml に調製)に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	30 分でフラッシュ
薬剤 4	ヤーボイ	1mg/kg	生食 100ml(全量 25ml に調製)に混注し、30 分で点滴
薬剤 5	生食	100ml	20 分間はヤーボイと同速度、その後は全開
※薬剤 6 開始前にレスタミンコーワ錠5錠を内服			
薬剤 6	生食 100ml+デカトロン(3.3mg)4A+ガスター 1A		10 分で点滴
薬剤 7	パロセトロン点滴用バッグ 0.75mg		30 分で点滴
薬剤 8	パクリタキセル 200mg/m ²		生食 500ml に混注し 180 分で点滴
薬剤 9	カルボプラチン AUC 6		生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 10	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(Day22)

薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用
薬剤 2	オブジーボ	360mg/body	生食 100ml(全量 100ml に調製)に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	50ml	フラッシュ用
※薬剤 4 開始前にレスタミンコーワ錠5錠を内服			
薬剤 4	生食 100ml+デカトロン(3.3mg)4A+ガスター 1A		10 分で点滴
薬剤 5	パロセトロン点滴用バッグ 0.75mg		30 分で点滴
薬剤 6	パクリタキセル 200mg/m ²		生食 500ml に混注し 180 分で点滴
薬剤 7	カルボプラチン AUC 6		生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 8	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	...	Day22	Day29	...	Day42
オブジーボ	↓		...	↓		...	休薬完了
ヤーボイ	↓		...			...	休薬完了
パクリタキセル	↓		...	↓		...	休薬完了
カルボプラチン	↓		...	↓		...	休薬完了

【肺非-51S】☆ CDDP＋PEM＋オプジーボ[®]＋ヤーボイ[®](検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)		
薬剤 1 生食	100ml	ルート確保用
薬剤 2 オプジーボ	360mg/body	生食 100ml(全量 100ml に調製)に混注し、30 分で点滴
薬剤 3 生食	100ml	30 分でフラッシュ
薬剤 4 ヤーボイ	1mg/kg	生食 100ml(全量 25ml に調製)に混注し、30 分で点滴
薬剤 5 生食	100ml	20 分間はヤーボイと同速度、その後は全開
薬剤 6 パロノセロン点滴用バッグ 0.75mg＋デカトロン(3.3mg)3A		15 分で点滴
薬剤 7 ソルテム 3 号 500ml＋硫酸 Mg 補正液 8ml		60 分で点滴
薬剤 8 ペメトレキセド	500mg/m ²	生食 100ml に混注し 10 分で点滴
※薬剤 9 開始前にアプレピタントカプセル 125mg を内服		
薬剤 9 生食	500ml	60 分で点滴
薬剤 10 ラシックス	20mg1A	ワンショット静注
薬剤 11 ランダ	75mg/m ²	生食 500ml(ーランダ量)に混注し 60 分で点滴
薬剤 12 生食	500ml	60 分で点滴

(Day22)

薬剤 1 生食	100ml	ルート確保用
薬剤 2 オプジーボ	360mg/body	生食 100ml(全量 100ml に調製)に混注し、30 分で点滴
薬剤 3 生食	50ml	フラッシュ用
薬剤 4 パロノセロン点滴用バッグ 0.75mg＋デカトロン(3.3mg)3A		15 分で点滴
薬剤 5 ソルテム 3 号 500ml＋硫酸 Mg 補正液 8ml		60 分で点滴
薬剤 6 ペメトレキセド	500mg/m ²	生食 100ml に混注し 10 分で点滴
※薬剤 7 開始前にアプレピタントカプセル 125mg を内服		
薬剤 7 生食	500ml	60 分で点滴
薬剤 8 ラシックス	20mg1A	ワンショット静注
薬剤 9 ランダ	75mg/m ²	生食 500ml(ーランダ量)に混注し 60 分で点滴
薬剤 10 生食	500ml	60 分で点滴

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	...	Day22	Day29	...	Day42
オプジーボ	↓		...	↓		...	休薬完了
ヤーボイ	↓		...			...	休薬完了
ペメトレキセド	↓		...	↓		...	休薬完了
ランダ	↓		...	↓		...	休薬完了

【肺非-52】M CBDCA+PEM+オブジーボ+ヤーボイ（検査付）

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用
薬剤 2	オブジーボ	360mg/body	生食 100ml(全量 100ml に調製)に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	30 分でフラッシュ
薬剤 4	ヤーボイ	1mg/kg	生食 100ml(全量 25ml に調製)に混注し、30 分で点滴
薬剤 5	生食	100ml	20 分間はヤーボイと同速度、その後は全開
薬剤 6	パロセトロン点滴用バッグ 0.75mg+デカドロン(3.3mg)3A		30 分で点滴
薬剤 7	ペメトレキセド	500mg/m ²	生食 100ml に混注し、10 分で点滴
薬剤 8	カルボプラチン	AUC 5	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 9	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(Day22)			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用
薬剤 2	オブジーボ	360mg/body	生食 100ml(全量 100ml に調製)に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	50ml	フラッシュ用
薬剤 4	パロセトロン点滴用バッグ 0.75mg+デカドロン(3.3mg)3A		30 分で点滴
薬剤 5	ペメトレキセド	500mg/m ²	生食 100ml に混注し、10 分で点滴
薬剤 6	カルボプラチン	AUC 5	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 7	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day8	...	Day22	Day29	...	Day42
オブジーボ	↓		...	↓		...	休薬完了
ヤーボイ	↓		...			...	休薬完了
ペメトレキセド	↓		...	↓		...	休薬完了
カルボプラチン	↓		...	↓		...	休薬完了

【肺非-53】 サイラムザ

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)		
薬剤 1	フェキソフェナジン塩酸塩 OD 錠 60mg1 錠	点滴開始前に内服
薬剤 2	生食 100ml+デカドロン(3.3mg)1A	30 分で点滴
薬剤 3	サイラムザ 10mg/kg	生食 250ml(全量 250ml に調製)に混注し 60 分で点滴
※忍容性が良好であれば 2 回目以降は 30 分まで短縮可		
薬剤 4	生食 100ml	ルートフラッシュ用
(初回は経過観察として 60 分で投与)		

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day14
サイラムザ	↓		休薬完了

【肺非-54-1】M CBDCA+nabPTX+Dur+Tre (初回検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用
薬剤 2	イジユド	75mg/body	生食 100ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	60 分で点滴(経過観察用)
薬剤 4	イミフィンジ	1500mg/body	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 5	生食	100ml	30 分で点滴(経過観察用)
薬剤 6	【側管】パロセトロン点滴用バッグ 0.75mg+デカトン(3.3mg)3A		30 分で点滴
薬剤 7	【側管】アブラキサン 100mg/m ²		30 分で点滴(生食に溶解し、ラベルに全量を記載)
薬剤 8	【側管】カルボプラチン AUC 6		生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 9	【側管】生食	100ml	フラッシュ用
(Day8、15)			
薬剤 1	生食 100ml+デカトン(3.3mg)1A		30 分で点滴
薬剤 2	アブラキサン	100mg/m ²	30 分で点滴(生食に溶解し、ラベルに全量を記載)
薬剤 3	生食	100ml	フラッシュ用

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
イジユド	↓			休薬完了
イミフィンジ	↓			休薬完了
アブラキサン	↓	↓	↓	休薬完了
カルボプラチン	↓			休薬完了

【肺非-54-2】M CBDCA+nabPTX+Dur+Tre

(2 回以降検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用
薬剤 2	イジユド	75mg/body	生食 100ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食	50ml	ルートフラッシュ用
薬剤 4	イミフィンジ	1500mg/ body	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 5	生食	50ml	ルートフラッシュ用
薬剤 6	【側管】パロセトロン点滴用バッグ 0.75mg+デカトロン(3.3mg)3A		30 分で点滴
薬剤 7	【側管】アブラキサン 100mg/m ²		30 分で点滴(生食に溶解し、ラベルに全量を記載)
薬剤 8	【側管】カルボプラチン AUC 6		生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 9	【側管】生食	100ml	フラッシュ用

(Day8、15)

薬剤 1	生食 100ml+デカトロン(3.3mg)1A		30 分で点滴
薬剤 2	アブラキサン	100mg/m ²	30 分で点滴(生食に溶解し、ラベルに全量を記載)
薬剤 3	生食	100ml	フラッシュ用

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
イジユド	↓			休薬完了
イミフィンジ	↓			休薬完了
アブラキサン	↓	↓	↓	休薬完了
カルボプラチン	↓			休薬完了

【肺非-54a-1】M CBDCA+nabPTX+Dur+Tre

($\leq 30\text{kg}$: 検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用
薬剤 2	イジユド	75mg/body	生食 100ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	60 分で点滴(経過観察用)
薬剤 4	イミフィンジ	20mg/kg	生食 100ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 5	生食	100ml	30 分で点滴(経過観察用)
薬剤 6	【側管】パロセトロン点滴用バッグ 0.75mg+デカトン(3.3mg)3A		30 分で点滴
薬剤 7	【側管】アブラキサン 100mg/m ²		30 分で点滴(生食に溶解し、ラベルに全量を記載)
薬剤 8	【側管】カルボプラチン AUC 6		生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 9	【側管】生食	100ml	フラッシュ用

(Day8、15)

薬剤 1	生食 100ml+デカトン(3.3mg)1A	30 分で点滴
薬剤 2	アブラキサン 100mg/m ²	30 分で点滴(生食に溶解し、ラベルに全量を記載)
薬剤 3	生食 100ml	フラッシュ用

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
イジユド	↓			休薬完了
イミフィンジ	↓			休薬完了
アブラキサン	↓	↓	↓	休薬完了
カルボプラチン	↓			休薬完了

【肺非-54a-2】M CBDCA+nabPTX+Dur+Tre

($\leq 30\text{kg}$:検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用
薬剤 2	イジユド	75mg/body	生食 100ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食	50ml	ルートフラッシュ用
薬剤 4	イミフィンジ	20mg/kg	生食 100ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 5	生食	50ml	ルートフラッシュ用
薬剤 6	【側管】パロセトロン点滴用バッグ 0.75mg+デカトロン(3.3mg)3A		30 分で点滴
薬剤 7	【側管】アブラキサン 100mg/m ²		30 分で点滴(生食に溶解し、ラベルに全量を記載)
薬剤 8	【側管】カルボプラチン AUC 6		生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 9	【側管】生食	100ml	フラッシュ用

(Day8、15)

薬剤 1	生食 100ml+デカトロン(3.3mg)1A		30 分で点滴
薬剤 2	アブラキサン	100mg/m ²	30 分で点滴(生食に溶解し、ラベルに全量を記載)
薬剤 3	生食	100ml	フラッシュ用

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
イジユド	↓			休薬完了
イミフィンジ	↓			休薬完了
アブラキサン	↓	↓	↓	休薬完了
カルボプラチン	↓			休薬完了

【肺非-55S1】☆CDDP＋PEM＋Dur＋Tre（初回検査付）

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用
薬剤 2	イジユド	75mg/body	生食 100ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	60 分で点滴（経過観察用）
薬剤 4	イミフィンジ	1500mg/body	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 5	生食	50ml	ルートフラッシュ用
薬剤 6	パロセトン点滴用バッグ 0.75mg＋デカロン(3.3mg)3A		15 分で点滴
薬剤 7	ソルデム 3 号 500ml＋硫酸 Mg 補正液 8ml		60 分で点滴
薬剤 8	ペメトレキセド	500 mg/m ²	生食 100ml に混注し 10 分で点滴
※薬剤 9 開始前にアプレピタントカプセル 125mg を内服			
薬剤 9	生食	500ml	60 分で点滴
薬剤 10	ラシックス	20mg1A	ワンショット静注
薬剤 11	ランダ	75mg/m ²	生食 500ml(ーランダ量)に混注し 60 分で点滴
薬剤 12	生食	500ml	60 分で点滴

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
イジユド	↓			休薬完了
イミフィンジ	↓			休薬完了
ペメトレキセド	↓			休薬完了
ランダ	↓			休薬完了

【肺非-55S2】☆CDDP＋PEM＋Dur＋Tre

(2 回目以降検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用
薬剤 2	イジユド	75mg/body	生食 100ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食	50ml	ルートフラッシュ用
薬剤 4	イミフィンジ	1500mg/body	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 5	生食	50ml	ルートフラッシュ用
薬剤 6	パロセトン点滴用バッグ 0.75mg＋デカロン(3.3mg)3A		15 分で点滴
薬剤 7	ソルテム 3 号 500ml＋硫酸 Mg 補正液 8ml	60 分で点滴	
薬剤 8	ペメトレキセド	500 mg/m ²	生食 100ml に混注し 10 分で点滴
※薬剤 9 開始前にアプレピタントカプセル 125mg を内服			
薬剤 9	生食	500ml	60 分で点滴
薬剤 10	ラシックス	20mg1A	ワンショット静注
薬剤 11	ランダ	75mg/m ²	生食 500ml(ーランダ量)に混注し 60 分で点滴
薬剤 12	生食	500ml	60 分で点滴

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
イジユド	↓			休薬完了
イミフィンジ	↓			休薬完了
ペメトレキセド	↓			休薬完了
ランダ	↓			休薬完了

【肺非-55aS1】☆CDDP＋PEM＋Dur＋Tre(≤30kg:検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用
薬剤 2	イジユド	75mg/body	生食 100ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	60 分で点滴(経過観察用)
薬剤 4	イミフィンジ	20mg/kg	生食 100ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 5	生食	50ml	ルートフラッシュ用
薬剤 6	パロセトン点滴用バッグ 0.75mg＋デカロン(3.3mg)3A		15 分で点滴
薬剤 7	ソルデム 3 号 500ml＋硫酸 Mg 補正液 8ml		60 分で点滴
薬剤 8	ペメトレキセド	500 mg/m ²	生食 100ml に混注し 10 分で点滴
※薬剤 9 開始前にアプレピタントカプセル 125mg を内服			
薬剤 9	生食	500ml	60 分で点滴
薬剤 10	ラシックス	20mg1A	ワンショット静注
薬剤 11	ランダ	75mg/m ²	生食 500ml(ーランダ量)に混注し 60 分で点滴
薬剤 12	生食	500ml	60 分で点滴

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
イジユド	↓			休薬完了
イミフィンジ	↓			休薬完了
ペメトレキセド	↓			休薬完了
ランダ	↓			休薬完了

【肺非-55aS2】☆CDDP＋PEM＋Dur＋Tre (≦30kg:検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用
薬剤 2	イジユド	75mg/body	生食 100ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食	50ml	ルートフラッシュ用
薬剤 4	イミフィンジ	20mg/kg	生食 100ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 5	生食	50ml	ルートフラッシュ用
薬剤 6	パロセトン点滴用バッグ 0.75mg＋デカロン(3.3mg)3A		
			15 分で点滴
薬剤 7	ソルデム 3 号 500ml＋硫酸 Mg 補正液 8ml		
			60 分で点滴
薬剤 8	ペメトレキセド	500 mg/m ²	生食 100ml に混注し 10 分で点滴
	※薬剤 9 開始前にアプレピタントカプセル 125mg を内服		
薬剤 9	生食	500ml	60 分で点滴
薬剤 10	ラシックス	20mg1A	ワンショット静注
薬剤 11	ランダ	75mg/m ²	生食 500ml(ーランダ量)に混注し 60 分で点滴
薬剤 12	生食	500ml	60 分で点滴

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
イジユド	↓			休薬完了
イミフィンジ	↓			休薬完了
ペメトレキセド	↓			休薬完了
ランダ	↓			休薬完了

【肺非-56-1】M CBDCA+PEM+Dur+Tre(初回検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用
薬剤 2	イジユド	75mg/body	生食 100ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	60 分で点滴(経過観察用)
薬剤 4	イミフィンジ	1500mg/body	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 5	生食	100ml	30 分で点滴(経過観察用)
薬剤 6	パロセトン点滴用バッグ 0.75mg+デカロン(3.3mg)3A		30 分で点滴
薬剤 7	ペメトレキセド	500 mg/m ²	生食 100ml に混注し 10 分で点滴
薬剤 8	カルボプラチン	AUC 5	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 9	生食	100ml	フラッシュ用

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
イジユド	↓			休薬完了
イミフィンジ	↓			休薬完了
ペメトレキセド	↓			休薬完了
カルボプラチン	↓			休薬完了

【肺非-56-2】M CBDCA+PEM+Dur+Tre

(2回目以降検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用
薬剤 2	イジユド	75mg/body	生食 100ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食	50ml	ルートフラッシュ用
薬剤 4	イミフィンジ	1500mg/body	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 5	生食	50ml	ルートフラッシュ用
薬剤 6	パロセトン点滴用バッグ 0.75mg+デカロン(3.3mg)3A		30 分で点滴
薬剤 7	ペメトレキセド	500mg/m ²	生食 100ml に混注し 10 分で点滴
薬剤 8	カルボプラチン	AUC 5	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 9	生食	100ml	フラッシュ用

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
イジユド	↓			休薬完了
イミフィンジ	↓			休薬完了
ペメトレキセド	↓			休薬完了
カルボプラチン	↓			休薬完了

【肺非-56a-1】M CBDCA+PEM+Dur+Tre(≤30kg:検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用
薬剤 2	イジユド	75mg/body	生食 100ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	60 分で点滴(経過観察用)
薬剤 4	イミフィンジ	20mg/kg	生食 100ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 5	生食	100ml	30 分で点滴(経過観察用)
薬剤 6	パロセトン点滴用バッグ 0.75mg+デカロン(3.3mg)3A		30 分で点滴
薬剤 7	ペメトレキセド	500mg/m ²	生食 100ml に混注し 10 分で点滴
薬剤 8	カルボプラチン	AUC 5	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 9	生食	100ml	フラッシュ用

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
イジユド	↓			休薬完了
イミフィンジ	↓			休薬完了
ペメトレキセド	↓			休薬完了
カルボプラチン	↓			休薬完了

【肺非-56a-2】M CBDCA+PEM+Dur+Tre (≦30kg:検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用
薬剤 2	イジユド	75mg/body	生食 100ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食	50ml	ルートフラッシュ用
薬剤 4	イミフィンジ 20mg/kg		生食 100ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 5	生食	50ml	ルートフラッシュ用
薬剤 6	パロセトン点滴用バッグ 0.75mg+デカロン(3.3mg)3A		30 分で点滴
薬剤 7	ペメトレキセド	500mg/m ²	生食 100ml に混注し 10 分で点滴
薬剤 8	カルボプラチン	AUC 5	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 9	生食	100ml	フラッシュ用

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
イジユド	↓			休薬完了
イミフィンジ	↓			休薬完了
ペメトレキセド	↓			休薬完了
カルボプラチン	↓			休薬完了

【肺非-57】L PEM+Dur (検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用
薬剤 2	イミフィンジ	1500mg/body	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食	50ml	ルートフラッシュ用
薬剤 4	生食 100ml+デカトロン(3.3mg)2A		30 分で点滴
薬剤 5	ペメトレキセド	500mg/m ²	生食 100ml に混注し 10 分で点滴
薬剤 6	生食	100ml	フラッシュ用

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
イミフィンジ	↓				休薬完了
ペメトレキセド	↓				休薬完了

【肺非-57a】L PEM+Dur (≦30kg:検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用
薬剤 2	イミフィンジ	20mg/kg	生食 100ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食	50ml	ルートフラッシュ用
薬剤 4	生食 100ml+デカトロン(3.3mg)2A		30 分で点滴
薬剤 5	ペメトレキセド	500mg/m ²	生食 100ml に混注し 10 分で点滴
薬剤 6	生食	100ml	フラッシュ用

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
イミフィンジ	↓				休薬完了
ペメトレキセド	↓				休薬完了

【肺非-58】L PEM+Dur+Tre (検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用
薬剤 2	イジユド	75mg/body	生食 100ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食	50ml	ルートフラッシュ用
薬剤 4	イミフィンジ	1500mg/body	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 5	生食	50ml	ルートフラッシュ用
薬剤 6	生食 100ml+デカトロン(3.3mg)2A		30 分で点滴
薬剤 7	ペメトレキセド	500 mg/m ²	生食 100ml に混注し 10 分で点滴
薬剤 8	生食	100ml	フラッシュ用

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
イジユド	↓				休薬完了
イミフィンジ	↓				休薬完了
ペメトレキセド	↓				休薬完了

【肺非-58a】L PEM+Dur+Tre (≤30kg:検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用
薬剤 2	イジユド	75mg/body	生食 100ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食	50ml	ルートフラッシュ用
薬剤 4	イミフィンジ	20mg/kg	生食 100ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 5	生食	50ml	ルートフラッシュ用
薬剤 6	生食 100ml+デカトロン(3.3mg)2A		30 分で点滴
薬剤 8	ペメトレキセド	500mg/m ²	生食 100ml に混注し 10 分で点滴
薬剤 9	生食	100ml	フラッシュ用

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
イジユド	↓				休薬完了
イミフィンジ	↓				休薬完了
ペメトレキセド	↓				休薬完了

【肺非-59S1】☆ CDDP＋GEM＋Dur＋Tre（初回検査付）

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用
薬剤 2	イジユド	75mg/body	生食 100ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	60 分で点滴（経過観察用）
薬剤 4	イミフィンジ	1500mg/body	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 5	生食	50ml	ルートフラッシュ用
薬剤 6	パロセトロン点滴用バッグ 0.75mg＋デカトロン(3.3mg)3A		15 分で点滴
薬剤 7	ソルデム 3 号 500ml＋硫酸 Mg 補正液 8ml		60 分で点滴
薬剤 8	ゲムシタビン	1000mg/m ²	5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
※薬剤 9 開始前にアプレピタントカプセル 125mg を内服			
薬剤 9	生食	500ml	60 分で点滴
薬剤 10	ラシックス	20mg1A	ワンショット静注
薬剤 11	ランダ	75mg/m ²	生食 500ml(ーランダ量)に混注し 60 分で点滴
薬剤 12	生食	500ml	60 分で点滴

（Day8）

薬剤 1	生食 100ml＋デカトロン(3.3mg)1A	30 分で点滴
薬剤 2	ゲムシタビン 1000mg/m ²	5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 3	生食 100ml	ルートフラッシュ用

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
イジユド	↓			休薬完了
イミフィンジ	↓			休薬完了
ゲムシタビン	↓	↓		休薬完了
ランダ	↓			休薬完了

【肺非-59S2】☆ CDDP＋GEM＋Dur＋Tre

(2 回目以降検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用
薬剤 2	イジユド	75mg/body	生食 100ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食	50ml	ルートフラッシュ用
薬剤 4	イミフィンジ	1500mg/body	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 5	生食	50ml	ルートフラッシュ用
薬剤 6	パロセトン点滴用バッグ 0.75mg＋デカロン(3.3mg)3A		15 分で点滴
薬剤 7	ソルテム 3 号 500ml＋硫酸 Mg 補正液 8ml	60 分で点滴	
薬剤 8	ゲムシタビン	1000mg/m ²	5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
※薬剤 9 開始前にアプレピタントカプセル 125mg を内服			
薬剤 9	生食	500ml	60 分で点滴
薬剤 10	ラシックス	20mg1A	ワンショット静注
薬剤 11	ランダ	75mg/m ²	生食 500ml(ーランダ量)に混注し 60 分で点滴
薬剤 12	生食	500ml	60 分で点滴

(Day8)

薬剤 1	生食 100ml＋デカロン(3.3mg)1A	30 分で点滴
薬剤 2	ゲムシタビン 1000mg/m ²	5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 3	生食 100ml	ルートフラッシュ用

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
イジユド	↓			休薬完了
イミフィンジ	↓			休薬完了
ゲムシタビン	↓	↓		休薬完了
ランダ	↓			休薬完了

【肺非-59aS1】☆ CDDP＋GEM＋Dur＋Tre

($\leq 30\text{kg}$: 検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用
薬剤 2	イジユド	75mg/body	生食 100ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	60 分で点滴(経過観察用)
薬剤 4	イミフィンジ	20mg/kg	生食 100ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 5	生食	50ml	ルートフラッシュ用
薬剤 6	パロセトロン点滴用バッグ 0.75mg＋デカトロン(3.3mg)3A		15 分で点滴
薬剤 7	ソルテム 3 号 500ml＋硫酸 Mg 補正液 8ml	60 分で点滴	
薬剤 8	ゲムシタビン	1000mg/m ²	5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
※薬剤 9 開始前にアプレピタントカプセル 125mg を内服			
薬剤 9	生食	500ml	60 分で点滴
薬剤 10	ラシックス	20mg1A	ワンショット静注
薬剤 11	ランダ	75mg/m ²	生食 500ml(ーランダ量)に混注し 60 分で点滴
薬剤 12	生食	500ml	60 分で点滴

(Day8)

薬剤 1	生食 100ml＋デカトロン(3.3mg)1A	30 分で点滴
薬剤 2	ゲムシタビン	1000mg/m ²
薬剤 3	生食	100ml
		ルートフラッシュ用

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
イジユド	↓			休薬完了
イミフィンジ	↓			休薬完了
ゲムシタビン	↓	↓		休薬完了
ランダ	↓			休薬完了

【肺非-59aS2】☆ CDDP＋GEM＋Dur＋Tre

($\leq 30\text{kg}$: 検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用
薬剤 2	イジユド	75mg/body	生食 100ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食	50ml	ルートフラッシュ用
薬剤 4	イミフィンジ	20mg/kg	生食 100ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 5	生食	50ml	ルートフラッシュ用
薬剤 6	パロセトン点滴用バッグ 0.75mg＋デカトン(3.3mg)3A		15 分で点滴
薬剤 7	ソルテム 3 号 500ml＋硫酸 Mg 補正液 8ml	60 分で点滴	
薬剤 8	ゲムシタビン	1000mg/m ²	5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
※薬剤 9 開始前にアプレピタントカプセル 125mg を内服			
薬剤 9	生食	500ml	60 分で点滴
薬剤 10	ラシックス	20mg1A	ワンショット静注
薬剤 11	ランダ	75mg/m ²	生食 500ml(ーランダ量)に混注し 60 分で点滴
薬剤 12	生食	500ml	60 分で点滴

(Day8)

薬剤 1	生食 100ml＋デカトン(3.3mg)1A	30 分で点滴
薬剤 2	ゲムシタビン 1000mg/m ²	5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 3	生食 100ml	ルートフラッシュ用

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
イジユド	↓			休薬完了
イミフィンジ	↓			休薬完了
ゲムシタビン	↓	↓		休薬完了
ランダ	↓			休薬完了

【肺非-60-1】M CBDCA＋GEM＋Dur＋Tre（初回検査付）

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用
薬剤 2	イジユド	75mg/body	生食 100ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	60 分で点滴（経過観察用）
薬剤 4	イミフィンジ	1500mg/body	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 5	生食	100ml	30 分で点滴（経過観察用）
薬剤 6	パロセトロン点滴用バッグ 0.75mg＋デカロン(3.3mg)3A		30 分で点滴
薬剤 7	カルボプラチン	AUC 5	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 8	ゲムシタビン	1000mg/m ²	5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 9	生食	100ml	フラッシュ用

（Day8）

薬剤 1	生食 100ml＋デカロン(3.3mg)1A	30 分で点滴
薬剤 2	ゲムシタビン 1000mg/m ²	5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 3	生食 100ml	フラッシュ用

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
イジユド	↓			休薬完了
イミフィンジ	↓			休薬完了
ゲムシタビン	↓	↓		休薬完了
カルボプラチン	↓			休薬完了

【肺非-60-2】M CBDCA＋GEM＋Dur＋Tre

(2 回目以降検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用
薬剤 2	イジユド	75mg/body	生食 100ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食	50ml	ルートフラッシュ用
薬剤 4	イミフィンジ	1500mg/body	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 5	生食	50ml	ルートフラッシュ用
薬剤 6	パロセトロン点滴用バッグ 0.75mg＋デカトン(3.3mg)3A		30 分で点滴
薬剤 7	カルボプラチン	AUC 5	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 8	ゲムシタビン	1000mg/m ²	5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 9	生食	100ml	フラッシュ用
(Day8)			
薬剤 1	生食 100ml＋デカトン(3.3mg)1A		30 分で点滴
薬剤 2	ゲムシタビン	1000mg/m ²	5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	フラッシュ用

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
イジユド	↓			休薬完了
イミフィンジ	↓			休薬完了
ゲムシタビン	↓	↓		休薬完了
カルボプラチン	↓			休薬完了

【肺非-60a-1】M CBDCA＋GEM＋Dur＋Tre

($\leq 30\text{kg}$: 検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用
薬剤 2	イジユド	75mg/body	生食 100ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	60 分で点滴(経過観察用)
薬剤 4	イミフィンジ	20mg/kg	生食 100ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 5	生食	100ml	30 分で点滴(経過観察用)
薬剤 6	パロセトロン点滴用バッグ 0.75mg＋デカトン(3.3mg)3A		30 分で点滴
薬剤 7	カルボプラチン	AUC 5	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 8	ゲムシタビン	1000mg/m ²	5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 9	生食	100ml	フラッシュ用
(Day8)			
薬剤 1	生食 100ml＋デカトン(3.3mg)1A		30 分で点滴
薬剤 2	ゲムシタビン	1000mg/m ²	5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	フラッシュ用

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
イジユド	↓			休薬完了
イミフィンジ	↓			休薬完了
カルボプラチン	↓			休薬完了
ゲムシタビン	↓	↓		休薬完了

【肺非-60a-2】M CBDCA＋GEM＋Dur＋Tre

($\leq 30\text{kg}$: 検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用
薬剤 2	イジユド	75mg/body	生食 100ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食	50ml	ルートフラッシュ用
薬剤 4	イミフィンジ	20mg/kg	生食 100ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 5	生食	50ml	ルートフラッシュ用
薬剤 6	パロセトン点滴用バッグ 0.75mg＋デカトン(3.3mg)3A		30 分で点滴
薬剤 7	カルボプラチン	AUC 5	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 8	ゲムシタビン	1000mg/m ²	5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 9	生食	100ml	フラッシュ用

(Day8)

薬剤 1	生食 100ml＋デカトン(3.3mg)1A	30 分で点滴
薬剤 2	ゲムシタビン 1000mg/m ²	5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 3	生食 100ml	フラッシュ用

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
イジユド	↓			休薬完了
イミフィンジ	↓			休薬完了
カルボプラチン	↓			休薬完了
ゲムシタビン	↓	↓		休薬完了

【肺非-61-1】 イミフィンジ(初回検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	イミフィンジ	1500mg/body	生食 250ml に混注し、60 分かけて点滴
薬剤 3	生食	100ml	(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
イミフィンジ	↓				休薬完了

【肺非-61-2】イミフィンジ(2 回目以降検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	イミフィンジ	1500mg/body	生食 250ml に混注し、60 分かけて点滴
薬剤 3	生食	100ml	(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
イミフィンジ	↓				休薬完了

【肺非-61a-1】 イミフィンジ(≦30kg: 初回検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	イミフィンジ	20mg/kg	生食 100ml に混注し、60 分かけて点滴
薬剤 3	生食	100ml	(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
イミフィンジ	↓				休薬完了

【肺非-61a-2】イミフィンジ(≦30kg:2回目以降検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	イミフィンジ	20mg/kg	生食 100ml に混注し、60 分かけて点滴
薬剤 3	生食	100ml	(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
イミフィンジ	↓				休薬完了

【肺非-62】 イミフィンジ+イジユド(検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用
薬剤 2	イジユド	75mg/body	生食 100ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食	50ml	ルートフラッシュ用
薬剤 4	イミフィンジ	1500mg/body	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 5	生食	100ml	ルートフラッシュ用

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
イジユド	↓				休薬完了
イミフィンジ	↓				休薬完了

【肺非-62a】 イミフィンジ+イジユド(≦30kg:検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用
薬剤 2	イジユド	75mg/body	生食 100ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食	50ml	ルートフラッシュ用
薬剤 4	イミフィンジ	20mg/kg	生食 100ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 5	生食	100ml	ルートフラッシュ用

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
イジユド	↓				休薬完了
イミフィンジ	↓				休薬完了

【肺非-63-1】M CBDCA+PTX+オブジーボ（初回検査付）

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用
薬剤 2	オブジーボ	360mg/body	生食 100ml(全量 100ml に調製)に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	50ml	10 分間はオブジーボと同速度、その後は全開
※薬剤 4 開始前にレスタミンコーワ錠5錠を内服			
薬剤 4	生食 100ml+デカトロン(3.3mg)4A+ガスター 1A		10 分で点滴
薬剤 5	パロセトロン点滴用バッグ 0.75mg		30 分で点滴
薬剤 6	パクリタキセル 200mg/m ²		生食 500ml に混注し 180 分で点滴
薬剤 7	カルボプラチン AUC 6		生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 8	生食	100ml	フラッシュ用

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
オブジーボ	↓			休薬完了
パクリタキセル	↓			休薬完了
カルボプラチン	↓			休薬完了

【肺非-63-2】M CBDCA+PTX+オブジーボ

(2 回目以降検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用
薬剤 2	オブジーボ	360mg/body	生食 100ml(全量 100ml に調製)に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	50ml	フラッシュ用
※薬剤 4 開始前にレスタミンコーワ錠5錠を内服			
薬剤 4	生食 100ml+デカロン(3.3mg)4A+ガスター 1A		10 分で点滴
薬剤 5	パロセトロン点滴用バッグ 0.75mg		30 分で点滴
薬剤 6	パクリタキセル 200mg/m ²		生食 500ml に混注し 180 分で点滴
薬剤 7	カルボプラチン AUC 6		生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 8	生食	100ml	フラッシュ用

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
オブジーボ	↓			休薬完了
パクリタキセル	↓			休薬完了
カルボプラチン	↓			休薬完了

【肺非-64】M エンハーツ

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	ハロ/セロン点滴用バッグ	0.75mg+デカロン(3.3mg)2A	30 分で点滴
薬剤 2	5%ブドウ糖	100ml	ハロ/セロン投与後フラッシュ用
薬剤 3	エンハーツ	5.4mg/kg	5%ブドウ糖 100ml に混注し 90 分で点滴
※初回投与の忍容性が良好の場合 30 分まで短縮可			
薬剤 4	5%ブドウ糖	100ml	ルートフラッシュ用

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
エンハーツ	↓			休薬完了