

【肺小-01S】☆ CDDP＋CPT-11

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	アプレピタントカプセル	125mg1Cap	制吐剤開始前に内服
薬剤 2	パロセトン点滴用バッグ	0.75mg＋デカドロン(3.3mg)3A	15 分で点滴
薬剤 3	ソルデム 3 号	500ml＋硫酸 Mg 補正液 8ml	60 分で点滴
薬剤 4	トポテシン	60mg/m ²	生食 500ml に混注し 90 分で点滴
薬剤 5	ラシックス	20mg1A	ワンショット静注
薬剤 6	ランダ	60mg/m ²	生食に混注(計 500ml)60 分で点滴
薬剤 7	生食	500ml	60 分で点滴

(Day8、15)

薬剤 1	グラニセトンバッグ	3mg1 袋＋デカドロン(3.3mg)1A	30 分で点滴
薬剤 2	トポテシン	60mg/m ²	生食 500ml に混注し 90 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
ランダ	↓				休薬完了
トポテシン	↓	↓	↓		休薬完了

【肺小-02】M CBDCA＋CPT-11

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	ハロセトロン点滴用バッグ 0.75mg＋デカドロン(3.3mg)3A		30 分で点滴
薬剤 2	カルボプラチン	AUC5	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	トポテシン	50mg/m ²	生食 500ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 4	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(Day8)

薬剤 1	グラニセトロンバッグ 3mg1 袋＋デカドロン(3.3mg)1A		30 分で点滴
薬剤 2	トポテシン	50mg/m ²	生食 500ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
カルボプラチン	↓			休薬完了
トポテシン	↓	↓		休薬完了

【肺小-03S】☆ CDDP＋VP-16

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	パロセトン点滴用バッグ 075mg＋デカトン(3.3mg)3A		15 分で点滴
薬剤 2	ソルデム 3 号＋硫酸 Mg 補正液 8ml		60 分で点滴
薬剤 3	アプレピタントカプセル 125mg1Cap		薬剤 4(生食 500ml)点滴開始時に内服
薬剤 4	生食	500ml	60 分で点滴
薬剤 5	ラシックス	20mg1A	ワンショット静注
薬剤 6	ランダ	80mg/m ²	生食 500ml に混注(計 500ml)とし 60 分点滴
薬剤 7	ラステット	100mg/m ²	生食 500ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 8	生食	100ml	フラッシュ用

(Day2、3)

薬剤 1	生食 100ml＋デカトン(3.3mg)2A	30 分で点滴
薬剤 2	アプレピタントカプセル 80mg 1Cap	午前中に内服
薬剤 3	ラステット 100mg/m ²	生食 500ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 4	生食 100ml	12 分で点滴

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day2	Day3	Day4	...	Day21
ランダ	↓					休薬完了
ラステット	↓	↓	↓			休薬完了

【肺小-04】M CBDCA+VP-16

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	パロセトロン点滴用バッグ 0.75mg+デカドロン(3.3mg)3A		30 分で点滴
薬剤 2	カルボプラチン	AUC5	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	ラステット	100mg/m ²	生食 500ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 4	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(Day2、3)

薬剤 1	生食 100ml+デカドロン 3.3mg × 2A		30 分で点滴
薬剤 2	ラステット	100mg/m ²	生食 500ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day2	Day3		Day21
カルボプラチン	↓				休薬完了
ラステット	↓	↓	↓		休薬完了

【肺小-05】M CPT-11

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1、8、15)			
薬剤 1	グラニセロンバッグ 3mg1 袋＋デカトロン 3.3mg × 2A		30 分で点滴
薬剤 2	トポテシン	100mg/m ²	生食 500ml に混注し 90 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	30 分で点滴(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
トポテシン	↓	↓	↓		休薬完了

【肺小-06】M AMR(カルセド)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1、2、3)			
薬剤 1	グラニセロンバッグ 3mg1 袋+デカトロン 3.3mg × 2A		30 分で点滴
薬剤 2	カルセド	45 mg/m ²	生食 50ml に混注し、全開で 10 分以内
薬剤 3	生食	100ml	10 分で点滴(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day2	Day3	Day4	...	Day21
カルセド	↓	↓	↓			休薬完了

【肺小-07】M NGT(ハイカムチン)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1、2、3、4、5)			
薬剤 1	グラニセロンバッグ 3mg1 袋＋デカトロン 3.3mg × 1A		30 分で点滴
薬剤 2	ハイカムチン	1mg/m ²	生食 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	10 分で点滴(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	...	Day21
ハイカムチン	↓	↓	↓	↓	↓			休薬完了

【肺小-09-1】M CBDCA+VP-16+テセントリク(初回検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用(ルート確保後、廃棄)
薬剤 2	テセントリク	1200mg/body	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食	50ml	10 分で点滴(フラッシュ用)
薬剤 4	パロセトン点滴用バッグ 0.75mg+デカロン(3.3mg)3A		30 分で点滴
薬剤 5	カルボプラチン	AUC5	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 6	ラステット	100mg/m ²	生食 500ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 7	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(Day2, 3)

薬剤 1	生食 100ml+デカロン 3.3mg × 2A	30 分で点滴
薬剤 2	ラステット 100mg/m ²	生食 500ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食 100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day2	Day3		Day21
テセントリク	↓				休薬完了
カルボプラチン	↓				休薬完了
ラステット	↓	↓	↓		休薬完了

【肺小-09-2】M CBDCA＋VP-16＋テセントリク

(2 回目以降検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用(ルート確保後、廃棄)
薬剤 2	テセントリク	1200mg/body	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 3	生食	50ml	10 分で点滴(フラッシュ用)
薬剤 4	パロセトン点滴用バッグ 0.75mg＋デカトン(3.3mg)3A		30 分で点滴
薬剤 5	カルボプラチン	AUC5	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 6	ラステット	100mg/m ²	生食 500ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 7	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(Day2, 3)

薬剤 1	生食 100ml＋デカトン 3.3mg × 2A	30 分で点滴
薬剤 2	ラステット 100mg/m ²	生食 500ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食 100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day2	Day3		Day21
テセントリク	↓				休薬完了
カルボプラチン	↓				休薬完了
ラステット	↓	↓	↓		休薬完了

【肺小-10】テセントリク(2回目以降検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	テセントリク	1200mg/body	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
テセントリク	↓			休薬完了

【肺小-11S1】☆ CDDP＋VP-16＋イミフィンジ(初回検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用(ルート確保後、廃棄)
薬剤 2	イミフィンジ	1500mg/body	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食	50ml	10 分で点滴(フラッシュ用)
薬剤 4	パロセトロン点滴用バッグ 075mg＋デカトン(3.3mg)3A		15 分で点滴
薬剤 5	ソルデム 3 号 500ml＋硫酸 Mg 補正液 8ml		60 分で点滴
薬剤 6	アプレピタントカプセル	125mg1Cap	薬剤 7(生食 500ml)点滴開始時に内服
薬剤 7	生食	500ml	60 分で点滴
薬剤 8	ラシックス	20mg1A	ワンショット静注
薬剤 9	ランダ	75mg/m ²	生食 500ml に混注(計 500ml)とし 60 分で点滴
薬剤 10	ラステット	100mg/m ²	生食 500ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 11	生食	100ml	ルートフラッシュ用

(Day2、3)

薬剤 1	アプレピタントカプセル	80mg1Cap	午前中に内服
薬剤 2	生食 100ml＋デカトン(3.3mg)2A		30 分で点滴
薬剤 3	ラステット	100 mg/m ²	生食 500ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 4	生食	100ml	ルートフラッシュ用

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day2	Day3	Day4	...	Day21
イミフィンジ	↓					休薬完了
ランダ	↓					休薬完了
ラステット	↓	↓	↓			休薬完了

【肺小-11S2】☆ CDDP＋VP-16＋イミフィンジ

(2 回目以降検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用(ルート確保後、廃棄)
薬剤 2	イミフィンジ	1500mg/body	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食	50ml	10 分で点滴(フラッシュ用)
薬剤 4	パロセトロン点滴用バッグ 075mg＋デカトン(3.3mg)3A		15 分で点滴
薬剤 5	ソルデム 3 号 500ml＋硫酸 Mg 補正液 8ml		60 分で点滴
薬剤 6	アプレピタントカプセル 125mg1Cap		薬剤 7(生食 100ml)点滴開始時に内服
薬剤 7	生食	500ml	60 分で点滴
薬剤 8	ラシックス	20mg1A	ワンショット静注
薬剤 9	ランダ	75mg/m ²	生食 500ml に混注(計 500ml)とし 60 分で点滴
薬剤 10	ラステット	100mg/m ²	生食 500ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 11	生食	100ml	ルートフラッシュ用

(Day2、3)

薬剤 1	アプレピタントカプセル 80mg1Cap	午前中に内服
薬剤 2	生食 100ml＋デカトン(3.3mg)2A	30 分で点滴
薬剤 3	ラステット 100mg/m ²	生食 500ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 4	生食 100ml	ルートフラッシュ用

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day2	Day3	Day4	...	Day21
イミフィンジ	↓					休薬完了
ランダ	↓					休薬完了
ラステット	↓	↓	↓			休薬完了

【肺小-12S1】☆ CDDP＋VP-16＋イミフィンジ(≤30kg:検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用(ルート確保後、廃棄)
薬剤 2	イミフィンジ	20mg/kg	生食 100ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食	50ml	10 分で点滴(フラッシュ用)
薬剤 4	パロセトロン点滴用バッグ 075mg＋デカトン(3.3mg)3A		15 分で点滴
	※薬剤 5 開始前にアプレピタントカプセル 125mg を内服		
薬剤 5	ソルデム 3 号 500ml＋硫酸 Mg 補正液 8ml		60 分で点滴
薬剤 6	生食	100ml	10 分で点滴
薬剤 7	ラシックス	20mg 1A	ワンショット静注
薬剤 8	ランダ	75mg/m ²	生食 500ml に混注(計 500ml)とし 60 分で点滴
薬剤 9	ラステット	100mg/m ²	生食 500ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 10	生食	100ml	ルートフラッシュ用

(Day2、3)

薬剤 1	アプレピタントカプセル 80mg 1Cap	午前中に内服
薬剤 2	生食 100ml＋デカトン(3.3mg)2A	30 分で点滴
薬剤 3	ラステット 100mg/m ²	生食 500ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 4	生食 100ml	ルートフラッシュ用

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day2	Day3	Day4	...	Day21
イミフィンジ	↓					休薬完了
ランダ	↓					休薬完了
ラステット	↓	↓	↓			休薬完了

【肺小-12S2】☆ CDDP+VP-16+イミフィンジ(≤30kg:検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用(ルート確保後、廃棄)
薬剤 2	イミフィンジ	20mg/kg	生食 100ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食	50ml	10 分で点滴(フラッシュ用)
薬剤 4	パロセトロン点滴用バッグ 075mg+デカトン(3.3mg)3A		15 分で点滴
	※薬剤 5 開始前にアプレピタントカプセル 125mg を内服		
薬剤 5	ソルデム 3 号	500ml+硫酸 Mg 補正液 8ml	60 分で点滴
薬剤 6	生食	100ml	10 分で点滴
薬剤 7	ラシックス	20mg 1A	ワンショット静注
薬剤 8	ランダ	75mg/m ²	生食 500ml に混注(計 500ml)とし 60 分で点滴
薬剤 9	ラステット	100mg/m ²	生食 500ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 10	生食	100ml	ルートフラッシュ用

(Day2、3)

薬剤 1	アプレピタントカプセル 80mg 1Cap	午前中に内服
薬剤 2	生食 100ml+デカトン(3.3mg)2A	30 分で点滴
薬剤 3	ラステット	100mg/m ² 生食 500ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 4	生食	100ml ルートフラッシュ用

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day2	Day3	Day4	...	Day21
イミフィンジ	↓					休薬完了
ランダ	↓					休薬完了
ラステット	↓	↓	↓			休薬完了

【肺小-13-1】M CBDCA＋VP-16＋イミフィンジ(初回検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用(ルート確保後、廃棄)
薬剤 2	イミフィンジ	1500mg/body	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食	50ml	10 分で点滴(フラッシュ用)
薬剤 4	パロセトン点滴用バッグ 0.75mg＋デカトン(3.3mg)3A		30 分で点滴
薬剤 5	カルボプラチン	AUC5	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 6	ラステット	100mg/m ²	生食 500ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 7	生食	100ml	ルートフラッシュ用

(Day2, 3)

薬剤 1	生食 100ml＋デカトン 3.3mg × 2A	30 分で点滴
薬剤 2	ラステット 100mg/m ²	生食 500ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食 100ml	ルートフラッシュ用

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day2	Day3	Day4	…	Day21
イミフィンジ	↓					休薬完了
カルボプラチン	↓					休薬完了
ラステット	↓	↓	↓			休薬完了

【肺小-13-2】M CBDCA＋VP-16＋イミフィンジ

(2 回目以降検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用(ルート確保後、廃棄)
薬剤 2	イミフィンジ	1500mg/body	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食	50ml	10 分で点滴(フラッシュ用)
薬剤 4	パロセトン点滴用バッグ 0.75mg＋デカトン(3.3mg)3A		30 分で点滴
薬剤 5	カルボプラチン	AUC5	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 6	ラステット	100mg/m ²	生食 500ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 7	生食	100ml	ルートフラッシュ用

(Day2, 3)

薬剤 1	生食 100ml＋デカトン 3.3mg × 2A	30 分で点滴
薬剤 2	ラステット 100mg/m ²	生食 500ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食 100ml	ルートフラッシュ用

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day2	Day3	Day4	...	Day21
イミフィンジ	↓					休薬完了
カルボプラチン	↓					休薬完了
ラステット	↓	↓	↓			休薬完了

【肺小-14-1】M CBDCA＋VP-16＋イミフィンジ(≦30kg:検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用(ルート確保後、廃棄)
薬剤 2	イミフィンジ	20mg/kg	生食 100ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食	50ml	10 分で点滴(フラッシュ用)
薬剤 4	パロセトン点滴用バッグ 0.75mg＋デカロン(3.3mg)3A		30 分で点滴
薬剤 5	カルボプラチン	AUC5	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 6	ラステット	100mg/m ²	生食 500ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 7	生食	100ml	ルートフラッシュ用

(Day2, 3)

薬剤 1	生食 100ml＋デカロン 3.3mg × 2A	30 分で点滴
薬剤 2	ラステット 100mg/m ²	生食 500ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食 100ml	ルートフラッシュ用

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day2	Day3	Day4	...	Day21
イミフィンジ	↓					休薬完了
カルボプラチン	↓					休薬完了
ラステット	↓	↓	↓			休薬完了

【肺小-14-2】M CBDCA+VP-16+イミフィンジ(≤30kg:検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用(ルート確保後、廃棄)
薬剤 2	イミフィンジ	20mg/kg	生食 100ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食	50ml	10 分で点滴(フラッシュ用)
薬剤 4	パロセトン点滴用バッグ 0.75mg+デカロン(3.3mg)3A		30 分で点滴
薬剤 5	カルボプラチン	AUC5	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 6	ラステット	100mg/m ²	生食 500ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 7	生食	100ml	ルートフラッシュ用

(Day2, 3)

薬剤 1	生食 100ml+デカロン 3.3mg × 2A	30 分で点滴
薬剤 2	ラステット 100mg/m ²	生食 500ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食 100ml	ルートフラッシュ用

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day2	Day3	Day4	...	Day21
イミフィンジ	↓					休薬完了
カルボプラチン	↓					休薬完了
ラステット	↓	↓	↓			休薬完了

【肺小-15】 イミフィンジ(2 回目以降検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	イミフィンジ	1500mg	生食 250ml に混注し、60 分かけて点滴
薬剤 3	生食	100ml	(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
イミフィンジ	↓				休薬完了

【肺小-16】 イミフィンジ(≦30kg:2 回目以降検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)	※輸液セットはシュアプラグ輸液セットを使用		
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	イミフィンジ	20mg/kg	生食 100ml に混注し、60 分かけて点滴
薬剤 3	生食	100ml	(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
イミフィンジ	↓				休薬完了