

【中皮腫-01S】☆ CDDP＋PEM

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	パロセトン点滴用バッグ	0.75mg＋デカロン(3.3mg)3A	15 分で点滴
薬剤 2	ソルテム 3 号	500ml＋硫酸 Mg 補正液 8ml	60 分で点滴
薬剤 3	ペメトレキセド	500mg/m ²	生食 100ml に混注し 10 分で点滴
※薬剤4開始前にアプレピタントカプセル 125mg を内服			
薬剤 4	生食	500ml	60 分で点滴
薬剤 5	ラシックス	20mg 1A	ワンショット静注
薬剤 6	ランダ	75mg/m ²	生食 500ml(ーランダ量)に混注し 60 分で点滴
薬剤 7	生食	500ml	60 分で点滴

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
ペメトレキセド	↓			休薬完了
ランダ	↓			休薬完了

【中皮腫-02S】☆ CDDP＋GEM

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	パロセトン点滴用バッグ	0.75mg＋デカドン(3.3mg)3A	15 分で点滴
薬剤 2	ソルデム 3 号	500ml＋硫酸 Mg 補正液 8ml	60 分で点滴
薬剤 3	ゲムシタビン	1000mg/m ²	5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
※薬剤4開始前にアプレピタントカプセル 125mg を内服			
薬剤 4	生食	500ml	60 分で点滴
薬剤 5	ラシックス	20mg 1A	ワンショット静注
薬剤 6	ランダ	80mg/m ²	生食 500ml(ーランダ量)に混注し 60 分で点滴
薬剤 7	生食	500ml	60 分で点滴

(Day8、15)

薬剤 1	グラニセトンバッグ	3mg1 袋＋デカドン(3.3mg)1A	30 分で点滴
薬剤 2	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	ルートフラッシュ用

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
ゲムシタビン	↓	↓	↓		休薬完了
ランダ	↓				休薬完了

【中皮腫-03-1】 オプジーボ＋ヤーボイ(初回検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	オプジーボ	360mg/body	生食 100ml(全量 100ml に調製)に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	30 分でフラッシュ
薬剤 4	ヤーボイ	1mg/kg	生食 100ml(全量 25ml に調製)に混注し、30 分で点滴
薬剤 5	生食	100ml	20 分間はヤーボイと同速度、その後は全開

(Day22)

薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	オプジーボ	360mg/body	生食 100ml(全量 100ml に調製)に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	10 分で点滴(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	...	Day22	Day29	...	Day42
オプジーボ	↓		...	↓		...	休薬完了
ヤーボイ	↓		...			...	休薬完了

【中皮腫-03-2】 オプジーボ＋ヤーボイ(2 回目以降検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	オプジーボ	360mg/body	生食 100ml(全量 100ml に調製)に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	30 分でフラッシュ
薬剤 4	ヤーボイ	1mg/kg	生食 100ml(全量 25ml に調製)に混注し、30 分で点滴
薬剤 5	生食	100ml	20 分間はヤーボイと同速度、その後は全開

(Day22)

薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	オプジーボ	360mg/body	生食 100ml(全量 100ml に調製)に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	10 分で点滴(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	...	Day22	Day29	...	Day42
オプジーボ	↓		...	↓		...	休薬完了
ヤーボイ	↓		...			...	休薬完了